

毛地黃(Digoxin)

服用的注意事項

國泰綜合醫院兒科 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 關於毛地黃

- 毛地黃是一種強心劑，可幫助心臟肌肉收縮得更好。服用毛地黃期間應注意下列事項：
 - ◆ 將藥物放在兒童拿不到的地方。
 - ◆ 在固定的地方（如月曆或冰箱上）註明每一次給予的劑量，或記下備忘的事。
 - ◆ 服藥前應先測量脈搏，脈搏數大於 60 次/分鐘才可服藥。

■ 服用方法

- 以規則的時間間隔服藥，通常是一天一次，如：每天早上九點。
- 給藥時間儘量安排在進食前一小時或進食後二小時。
- 小心地給予藥物，將藥物慢慢地注入口中。
- 勿將藥物與其他食物或液體混合，因當病童拒絕進食時無法確定服入的藥物是多少。

- 服藥後 15 分鐘內嘔吐者應再給藥一次；若超過 15 分鐘才吐，則不要再給藥。
- 若病童已有牙齒，服藥後應進食開水，以防齲齒。

■ 忘記給藥時

忘了給藥的時間超過 6 小時，則當日暫停給予，隔日再依原來的給藥時間服藥。

■ 下列情況應立即返院檢查

- 連續忘記給藥超過二次。
- 不小心給藥超過劑量。
- 有噁心、嘔吐、食慾不振等情況。
- 當脈搏低於每分鐘 60 次。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院	(02)27082121	小兒科病房	轉 5511-3
		小兒加護病房	轉 6553
汐止國泰綜合醫院	(02)26482121	小兒科病房	轉 2651
新竹國泰綜合醫院	(03)5278999	小兒科病房	轉 8081
		小兒加護病房	轉 8001

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AD100.043.2017.02 九修