

多汗症之治療——

胸腔鏡交感神經切除術

國泰綜合醫院 外科部 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 治療方法

在全身麻醉和指溫測定器的監視下，藉著胸腔鏡，經由腋下第2肋間插入胸腔，以雷射或特殊電刀燒灼第2胸椎神經節。

■ 術後處理

- 雙手掌會呈現發紅或乾熱感覺是正常、暫時的現象可塗抹乳霜，慢慢會改善。
- 依醫囑服用止痛劑，以減輕傷口疼痛。
- 身體其他部位可能因代償關係而較易出汗。
- 術後偶會胸悶、呼吸困難，可做深呼吸，必要時醫護人員將予氧氣及安排胸部X光檢查。
- 不需天天換藥，保持乾燥，滿一週後可拆線。
- 術後1~2天若無特殊情況，於醫師同意後予出院門診追蹤。

祝

早日康復

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5601-5603

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 8101-8102

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 2901-2903

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AC000.066.2014.01 七修

2023.01 審閱