

認識植牙

國泰綜合醫院口腔顎面外科編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 何謂植牙

牙齒因疾病拔除造成缺牙，種植人工牙根，即為植牙。

■ 植牙的分類

■ 立即植牙

拔牙後，立即植入人工牙根。

■ 快速植牙

拔牙一個月後，植入人工牙根。

■ 延遲植牙

拔牙 2~3 個月後，植入人工牙根。

■ 病 因

■ 蛀牙

■ 牙髓病變

■ 牙周病

■ 症 狀

- 缺牙
- 咀嚼不方便

■ 治 療

治療目標在改善缺牙所造成的咀嚼功能受損，一般植牙後約需等 3—6 個月，再做假牙。

■ 開刀後應注意事項

- 咬緊紗布 45 分鐘，不可說話，不可吐口水，因為這樣能幫助止血。
- 不可用舌頭去舔或吸吮傷口，不可用吸管吸食飲料，以免引起更多的流血和疼痛，而且易發炎。
- 應遵照醫師指示服藥。
- 應盡量維持充分睡眠及休息，飲多量水份或果汁。
- 四十八小時內進用軟、流質食物，避免用手術部位咀嚼。
- 術後請勿抽菸、喝酒。
- 手術後於開刀部位外側臉頰冰敷，冰敷 20 分、休息 40 分連續數次，以防腫脹及止血。第三天起換

- 熱敷，熱敷 20 分，休息 40 分直至消腫為止。
- 無論傷口是否會痛，醫師開的藥一定要按時吃，以防止傷口發炎，第四天後仍然疼痛或有出血不止等緊急現象，應立即來本院診治。
 - 如有縫線，應於一、二週後回本院拆線。
 - 成功的醫療建立於病人的合作。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 8850-8855

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2890-2899

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3720

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AK200.078.2023.01 五修