

認識活動假牙

國泰綜合醫院 口腔醫學部 編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 何謂活動假牙

病人可以自行取下及放回口內的假牙。

■ 製作活動假牙的目的

- 美觀
- 維持缺牙空間
- 重建咬合關係
- 治療期間的過渡性假牙

■ 何時需要做活動假牙

當缺牙數目太多，造成剩餘牙齒無法承擔固定假牙負荷，則必須做活動假牙。

■ 活動假牙的維護

1. 睡覺前應將活動假牙取下，以便組織可以休息。
並且將活動假牙放置有水覆蓋的容器內，以防假牙脫水及體積改變。
 2. 可在水槽或用臉盆放水，避免保養假牙時手沒拿穩，不慎摔壞變形。
 3. 使用軟毛牙刷來清潔活動假牙，不可使用

牙膏等研磨劑。

4. 清洗完活動假牙後，要浸泡假牙清潔錠進行消毒。
5. 口內剩餘牙齒和固定假牙也須用牙刷清潔，並且要有牙線、牙間刷的輔助使用，以減少齲齒和牙周病的發生。

■ 門診追蹤

- 病人在初次戴上假牙後需依醫師安排回診，以進一步調整假牙的使用情況
- 正常情況下應每隔三到六個月回診一次
- 由於口腔組織會隨時間而改變，在長期使用，骨頭與牙肉在長期受力下會逐漸持續吸收，導致假牙出現晃動或鬆脫現象，而需調整，重襯底、換底甚至重做。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

國泰綜合醫院	(02)27082121	轉 8850-8855
新竹國泰綜合醫院	(03)5278999	轉 2890-2899
汐止國泰綜合醫院	(02)26482121	轉 3720

我們將竭誠為您服務！
國泰綜合醫院關心您！

AK100.080.2023.01 六修
2024.08 審閱