

熱性痙攣

國泰綜合醫院 急診室 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 何謂熱性痙攣

熱性痙攣是因為發燒而引起的抽搐，通常發作都在發燒的 24 小時以內，特別是前幾個小時；一般發生在六個月到五歲的孩童時期，高峰期約一歲半左右。

■ 日常生活注意事項

- 退燒（提早）。
- 讓病人側身躺下或頭側一邊，以防嘔吐物吸入或嗆到；解開束縛物，保持呼吸道順暢。
- 大人保持鎮靜，不要慌張。
- 在旁守護他，並清除現場危險物品；切勿強行約束或強行打開牙關，勿將任何物品塞入口中。
- 緊急送至醫院處理。
- 仔細觀察抽痙情況及記錄持續時間。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 急診室 轉 3761

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 急診室 轉 3910

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 急診室 轉 1190

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AX100.123.2022.09 九修

2023.01 審閱