

B 型肝炎預防接種須知

國泰綜合醫院 嬰兒室 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 嬰兒 B 型肝炎預防注射的重要性

肝癌、肝硬化為我國主要死因之一，都與 B 型肝炎慢性帶原者有密切關係，年幼時期的感染易演變成慢性帶原者，早期預防注射能有效預防 B 型肝炎的感染。

■ 嬰兒需接種 B 型肝炎免疫球蛋白嗎？

孕婦若為 B 肝帶原者，嬰兒出生 24 小時內除需接受一劑 B 型肝炎免疫球蛋白及按時接受三劑疫苗注射外，可於出生滿 12 個月大時接受 B 型肝炎表面抗原（HBsAg）及 B 型肝炎表面抗體（anti-HBs）檢測。若孕婦不是帶原者，嬰兒只需按時接受三劑疫苗注射即可。

■ B 型肝炎預防注射的方式及副作用

B 型肝炎疫苗：新生兒出生後即刻、一個月及六個月各注射一劑。嬰兒接種在大腿前外側，疫苗以肌肉注射方式給予，一般而言很少發生特別的反應，其

中最常見的是注射部位局部酸痛，偶有輕微發燒，但很少見（一般注射後二天內消退）。B 型肝炎疫苗除與日本腦炎疫苗需隔一個月注射外，可和其他疫苗同時接種，但接種部位需分開。

■ B 型肝炎預防注射的安全性及有效性？

經實驗研究發現，凡是按照規定時間注射，可有效預防 B 型肝炎感染。B 型肝炎疫苗製造過程嚴謹，且經過各種檢定，確定安全。我國及世界其他國家，接受 B 型肝炎預防注射的人並沒有發生不良的副作用，也沒有因預防注射而得到任何病毒感染。

■ 到那裡接受 B 型肝炎預防注射？

請攜帶「兒童健康手冊」及戶口名簿或健保 IC 卡至本院兒科門診接受 B 型肝炎預防注射，您也可至各鄉、鎮、市、區衛生所辦理接種。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 嬰兒室轉 3555-6

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 嬰兒室轉 2621-2

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 嬰兒室轉 2757-8

我們將竭誠為您服務！國泰綜合醫院關心您！

AD1R1.207.2020.04 六修

2021.01 審閱