

# 子宮搔刮術

國泰綜合醫院產房 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院  
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

## ■ 前言

子宮搔刮術通常是針對不正常的子宮出血或某些因素，使胎兒無法保存時所進行的手術，可作為檢查或治療之用。

## ■ 手術前注意事項

- 手術當天包括開水需禁食 6-8 小時(慢性病治療藥物仍可服用或帶至醫院備用)。
- 手術期間必須有家屬陪同。

## ■ 手術過程

- 協助注射點滴，等入手術室後注射麻醉藥品—讓您睡著後再進行手術，由主治醫師執行子宮搔刮手術。
- 手術後麻醉藥效未退，故需至恢復室休息 1~2 小時，待麻醉藥效消退時才返家休息。

## ■ 手術後注意事項

- 手術後 24 小時內，請勿自行開車、騎車，如需外出，

務必請家人陪同，勿做重大事件之決定，如：帳戶現金移轉等。

- 回家後先喝水，如無不適可採少量多餐進食，有嘔吐噁心情形，則休息半小時後再試，採漸進式恢復正常飲食。但術後一星期內請勿食用含有中藥材如人蔘、酒精、辛辣等刺激性食物。
- 手術後宜休息半天至一天，並請按時服藥。
- 手術後一週內不宜做粗重工作，採淋浴方式洗澡。
- 二週內不宜有性行為。
- 手術後一星期內會有少量出血，若出血量比平常月經量多或腹痛、發燒時應立刻就醫。
- 手術後陰道塞入紗布：無、有；塞入紗布數\_\_\_\_片、取出時間\_\_\_\_\_。
- 手術後請按預約時間回門診檢查。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 產房轉 3551-2

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 產房轉 3800-2

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 產房轉 2751-2

我們將竭誠為您服務！

AE1V1.213.2017.07 十一修  
2021.09 審閱