

# 子宮頸錐狀切除術

國泰綜合醫院產房 護理部編印著作權人：國泰綜合醫院  
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

## ■ 前言

子宮頸錐狀切除術適用於子宮抹片檢查、子宮頸切片檢查；或陰道鏡檢查後，發現子宮頸有不正常的細胞變化，或疑似有不正常的組織，可藉此手術協助診斷及治療。

## ■ 手術前注意事項

- 手術時間避免安排在月經期間。
- 手術當天包括開水需禁食 6-8 小時（慢性病治療藥物仍可服用或帶至醫院備用）。
- 手術期間必須有家屬陪同。

## ■ 手術過程

- 協助注射點滴，進入手術室後注射麻醉藥品—讓您睡著後再進行手術，由主治醫師執行手術。
- 手術後麻醉藥效未退，故需至恢復室休息 1~2 小時，待清醒無頭暈情況才返家休息。

## ■ 手術後注意事項

- 回家後先喝水，如無不適可採少量多餐進食，有嘔吐噁心情形，則休息半小時後再試，採漸進式恢復正常飲食。
- 手術後宜返家臥床休息一天，如無不適隔天可正常作息，並按時服藥。
- 4 週內不宜做粗重工作亦不宜性行為或增加腹部壓力之動作，以避免傷口裂開引起出血。
- 應採淋浴方式洗澡。傷口會自行結痂脫落，盡量保持乾燥、乾淨，減少摩擦，勿陰道灌洗。
- 手術後 1-2 週內因組織恢復過程會有水樣液體分泌物屬正常現象，術後 4 週內仍會有傷口滲血情形，若出血量多、腹痛或發燒時應立刻就醫。
- 少數人手術後會有傷口裂開大出血情形，宜準備塞式衛生棉條，如大出血時應立即使用衛生棉條壓迫止血並且返院就醫處理。
- 手術後 4-6 週經醫師確認傷口癒合即可恢復性生活。
- 請依醫囑按時服用藥物及返診。

■返院複診時間\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

上午 或 下午 第\_\_\_\_\_診 醫師\_\_\_\_\_

■手術後陰道塞入紗布：無、有；

塞入紗布數\_\_\_\_\_片、取出時間\_\_\_\_\_。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 3551-2

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 2601-2

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2751-2

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AE1V1.214.2013.12 八修  
2021.01 審閱