羊膜穿刺術

國泰綜合醫院 產房 護理部編印　著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 前言

懷孕 16~18 週左右實施羊膜穿刺術，目的是協助遺傳學之診斷。

■ 手術前注意事項

- 檢查前需排空膀胱。
- 超音波檢查胎兒週數大小及羊水量等。

■ 手術過程

- 檢查時採平躺姿勢，請儘量將身體放輕鬆。
  （手術過程中，勿隨意變動姿勢。）
- 消毒腹部，並在超音波引導下執行羊膜穿刺術。
- 穿刺部位如針孔大小，以無菌透明膠布覆蓋，當日採淋浴方式洗澡前即可撕掉。
- 手術結束會再以超音波觀察胎兒的活動情況，若無異常情況可返家休息。

■ 手術後注意事項

■羊膜穿刺的合併症為早產、流產、子宮感染、疼痛、陰道出血等，但這些合併症發生率不超過百分之一。

■羊膜穿刺術後不需飲食限制，應多休息，避免粗重工作。

■如有下列症狀請立即返院檢查：

◆有不尋常的胎兒過度活動或無胎動。

◆破水或陰道有異常分泌物流出（如大量透明分泌物或出血）。

◆子宮收縮或劇烈腹痛。

◆發燒或全身顫抖。

■手術後依約診時間返回婦產科門診作複診

已為您預約:___月____日____午____門診追蹤檢查。

■約手術後 3 週，可返回婦產科門診看正式報告。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院　(02)27082121　產房轉 3551-2

汐止國泰綜合醫院　(02)26482121　產房轉 2601-2

新竹國泰綜合醫院　(03)5278999　產房轉 2751-2

我們將竭誠為您服務！　國泰綜合醫院關心您！

AE1V1.221.2024.11 十三修

2026.01 審閱