

電燒手術

國泰綜合醫院 產房 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 前言

電燒術是治療慢性子宮頸發炎或會陰部尖型濕疣的一種治療方式，主要以電燒的熱破壞其病變組織，使其達到治療的目的。

■ 手術前注意事項

- 手術時間避免安排在月經期間。
- 手術當天包括開水需禁食 6-8 小時（慢性病治療藥物仍可服用或帶至醫院備用）。
- 手術期間必須有家屬陪同。

■ 手術過程

- 協助注射點滴，進入手術室後注射麻醉藥品一讓您睡著後再進行手術，由主治醫師執行手術。
- 手術後麻醉藥效未退，故需至恢復室休息 1~2 小時，待麻醉藥效消退時才返家休息。

■ 手術後注意事項

- 手術後 24 小時內，請勿自行開車、騎車，如需外出，務必請家人陪同，勿做重大事件之決定，如：簽支票等。
- 回家後先喝水，如無不適可採少量多餐進食，有嘔吐噁心時，則休息半小時後再試，採漸進式恢復正常飲食。
- 手術部位應盡量保持乾淨、乾燥、減少摩擦，暫時停止性生活，不要使用陰道棉條。
- 傷口會有疼痛感，請依醫囑指示服用藥物，減輕疼痛。
- 活動無特別限制。若有微量滲血，可直接加壓止血，傷口約在 7—10 天會結痂癒合。
- 手術後依預約日期回婦產科門診檢查。
已為您預約： 月 日 午 門診追蹤檢查。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 3551-2

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 2601-2

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2751-2

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AE1V1.237.2022.11 八修

2023.01 審閱