

# 透析患者的日常生活保健

國泰綜合醫院 透析中心 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院  
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

## ■ 目的

除優質的透析治療外，加強患者個別性日常生活自我保健，將更有效提升患者的「日常生活品質」。

## ■ 日常照護注意事項

- 按時透析：規則的接受透析治療，避免肺積水及身體的毒素積存過多，造成嚴重酸中毒、血鉀過高，危及生命，而且引起透析治療時的不適症狀。
- 均衡飲食：足夠的熱量攝取，日常注意水份、鉀、磷、鹽份的控制。
- 適度運動與休息：運動的四個順序--量血壓與脈搏→預備體操→運動→執行緩和體操。
- 控制體重與血壓：水份控制--每次透析時以不超過自己乾體重的 5%~6% 為原則，並按時測量並記錄血壓與紀錄，若有任何血壓過高、過低的緊急情況及不舒服發生，應立即至門診、急診檢查。

- 控制血糖：透析患者的 HbA<sub>1</sub>C 控制目標，似乎仍缺乏共識，建議 7-9% 中間最好，並搭配平日血糖機的數值 < 200mg/dl，以降低其它糖尿病的併發症，如：眼睛視網膜病變、週邊神經病變、或足部傷口問題。
- 維持瘻管通暢：一天 3 次施行瘻管熱敷、按摩、握球運動。
- 瘻管異常狀況：隨時注意瘻管部位是否紅、腫、熱、痛、及血流聲等症狀，如有發炎現象勿熱敷，應立即就醫，不可拖延至洗腎日。
- 正確服藥：養成按時服藥習慣，即使外出仍須將平時服用的藥物攜帶身邊。
- 預防感染：注意衛生習慣，發燒、咳嗽或不適症狀需立即求診。
- 維持排便通暢：食用高纖維蔬菜水果並配合軟便劑使用，養成定時排便的習慣。

## ■運動的好處

增加心肺功能，促進血液循環、常保身心健康。

## ■ 何時開始運動

透析治療初期，可能會不舒服且容易疲倦，但透析治療穩定後，身體狀況改善，食慾漸漸好轉，那麼此時此刻便可以開始運動。

## ■ 運動規則

- 運動時間逐漸增加，從 10 分鐘~20 分鐘開始，最後至少每天 1 小時，早晚各一次。
- 溫和運動，避免劇烈運動。
- 身體不適應停止運動。

## ■ 運動的效果

- 對體力有信心，精神更佳。
- 流汗，可使每次洗腎脫水可減少，降低透析中不適症狀。
- 改善貧血，提升血色素。
- 增加肌肉張力，降低四肢無力症狀。
- 增加腸子蠕動，促進食慾，對排便更有利。
- 可改善睡眠品質。
- 增加心肺功能，維持血壓平穩。

- 增加血循，改善血液循環。
- 促進新陳代謝。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 3171-3173

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2651

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3272-3273

國泰綜合醫院 透析中心 關心您！

AA610.275.2020.04 六修