

血管硬化劑注射治療後 照顧須知

國泰綜合醫院 手術室 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 前言

血管瘤和血管畸形，都可以利用硬化劑進行血管內或病灶注射來治療，注射後有些得以局部壓迫性包紮治療，依情況可再加上雷射或手術，使治療結果更達完美。

■ 治療前注意事項

- 請您或您的親人填寫手術同意書，未滿 20 歲要由法定代理人填寫。
- 門診時醫師會評估您的狀況，決定麻醉方式。須全身麻醉者，應空腹 6~8 小時（包括水及牛奶），以防麻醉中嘔吐而發生意外；如為局部麻醉者，則不需禁食。
- 全身靜脈麻醉者，檢查時須家屬陪同。

■ 治療中注意事項

- 全身靜脈麻醉者，醫護人員會先協助您準備好治療姿勢，才讓您睡著進行治療。
- 局部麻醉者，注射治療過程您必須放輕鬆並聽從醫護人員的指示。

■ 治療後注意事項

- 採全身靜脈麻醉者，注射治療後，需至恢復室休息 1~2 小時，待意識完全清醒，無身體不適才可返家休息，返家後可先喝水，如無不適方可採少量多餐方式進食，但如有嘔吐、噁心情形，宜半小時後再試，並採漸進式恢復正常飲食。
- 若無噁心、嘔吐情形或其他限制，請儘量多攝取水份，1 天以 1500c.c.~2500c.c.幫助藥物代謝排出。
- 治療後 24 小時內為了安全起見，請勿自行開車、騎機車或外出，如外出務必請家人陪同，且勿做重大事件之決定，如簽支票等。
- 治療後 24 小時內可能會有疼痛情形，可使用冰敷或止痛藥。
- 治療部位會局部腫脹，約 1~2 周左右才會消退。

- 治療後之照顧因人而異，通常會使用面罩或束衣進行局部壓迫。穿戴時間：
 - a. 治療後請全天穿戴持續二星期，壓迫以利治療效果（洗澡或用餐時可暫時脫掉）。
 - b. 面罩或束衣需持續使用二個月。
 - c. 下肢部位、建議平日活動多或者運動時，長期穿著彈性壓力褲襪以預防腫痛。
- 注射部位的皮膚觀察：皮膚局部變化若有變黑變白皆是異常現象需觀察其變化，若症狀持續未有改善，發生其他局部改變，如水泡、破皮、潰瘍時，請立即回院返院檢查。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 手術室 (02)27082121 轉 3370

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AC000.283.2021.01 六修

2023.01 審閱