

內視鏡十二指腸乳突切開術

國泰綜合醫院 腸胃內科編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 定義

用內視鏡，經十二指腸之膽胰管入口，注入顯影劑使膽胰管顯影，再經 X 光攝影後，觀察膽胰管的病變。對膽道結石或十二指腸乳突阻塞者的患者，利用內視鏡施行十二指腸乳突括約肌切開術，改善膽汁排泄障礙情形。

■ 檢查前注意事項

- 早上檢查者前日午夜十二時後禁食，下午檢查者當日早餐（7 點）後禁食（包括所有藥物、香菸、開水等），並請採清淡飲食。
- 填妥內視鏡逆行性胰膽攝影術檢查同意書。
- 若對顯影劑過敏者請事先告知。
- 口服抗凝血劑者請事先告知。
- 先更換檢查衣、排空膀胱、去除假牙及眼鏡；塗口紅、指甲油者，請先擦除。

- 檢查前 15~30 分鐘會先給肌肉注射平滑肌肌肉鬆弛劑（65 歲以上男性、攝護腺肥大、青光眼患者及過敏者則避免注射），以減緩嘔吐反射和不適。
- 檢查前 5 分鐘以麻醉噴劑作深部喉頭局部麻醉。
- 必要時會給予止痛劑及鎮靜藥物。

■ 檢查中注意事項

- 給予嘴巴含著咬口器，檢查進行前醫師會請病人哈口氣，並將十二指腸纖維鏡經口咽食道放入十二指腸中。
- 過程中可能會引發嘔吐反射，可藉由吞嚥的動作好讓內視鏡順利通過喉嚨以進入到胃部及十二指腸。
- 當內視鏡通過喉嚨之後則請不需再做吞嚥的動作，以避免噎到。
- 檢查進行中，醫師會由內視鏡將氣體打入以擴張胃部，可能會有胃脹不適的成覺，其為正常現象，可請藉由鼻子吸氣、嘴巴哈氣以減緩不適。
- 如有必要時醫師會利用一些治療用器械，以處理膽管或胰管內的病變。

■ 檢查後注意事項

- 請於一小時後待吞嚥反射恢復方可進食。
- 檢查後喉頭偶有疼痛不適感，2~3 天後即會慢慢消失，可用生理食鹽水漱口。
- 若有急性持續性腹痛、噁心、嘔吐、發燒、出血及吞嚥或呼吸困難等情形，請立即告知醫護人員或至本院急診就醫。
- 檢查後，少數人可能會有出血之情形 (< 5%)，應注意大便顏色有無變化，若有變成黑色或紅色應立即回診。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 3120

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3151

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2611

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AA310.290.2023.06 六修