

內視鏡逆行性膽胰管攝影

國泰綜合醫院 腸胃內科 編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 定義

用內視鏡，經由十二指腸之膽胰管入口，注入顯影劑使膽胰管顯影，再經由 X 光攝影後觀察膽胰管的病變。常用於診斷不明原因的阻塞性黃膽、膽結石及胰臟病變等。

■ 檢查前注意事項

- 早上檢查者，前一日午夜十二時後禁食，下午檢查者當日早餐（7 點）後禁食（包括所有藥物、香菸、開水等）。
- 填妥內視鏡逆行性胰膽攝影術檢查同意書。
- 若對顯影劑過敏者請事先告知醫護人員。
- 口服抗凝血劑者請事先告知醫護人員。
- 更換檢查衣、排空膀胱、去除假牙及眼鏡；塗口紅、指甲油者，請先擦除。
- 檢查前 15~ 30 分鐘會先給肌肉注射平滑肌肌肉鬆

弛劑（65 歲以上男性、攝護腺肥大、青光眼患者及對肌肉鬆弛劑過敏者則避不予注射），以減緩檢查時嘔吐反射和不適。

- 檢查前 5 分鐘以麻醉噴劑作深部喉頭局部麻醉。
- 必要時會給予止痛劑及鎮靜藥物。

■ 檢查中注意事項

- 給予嘴巴含著咬口器，檢查進行前醫師會請病患哈口氣，並將十二指腸纖維鏡經口咽食道推送入十二指腸中。
- 過程中會引發嘔吐反射，可藉由吞嚥的動作讓內視鏡順利經由喉嚨以進入到胃部及十二指腸。
- 當內視鏡已進入喉嚨之後，請不要再做吞嚥的動作，以避免噎到。
- 檢查進行中，醫師會由內視鏡將氣體打入胃內以擴張胃部，可能會有胃脹不適的成覺，此為正常現象，可藉由鼻子吸氣、嘴巴哈氣以減緩不適。

■ 檢查後注意事項

- 當日檢查後，何時禁食，醫師會視情況告知受檢者

何時可禁食。

- 檢查後喉頭偶有疼痛不適感，應2-3天後即會消失，可用生理食鹽水漱口。
- 若有急性持續性腹痛、噁心、嘔吐、發燒、出血及吞嚥或呼吸困難等情形，請立即告知醫護人員或至本院急診就醫。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 3120

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3151

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2611

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AA310.291.2021.01 五修