

保命防跌—住院安全

國泰綜合醫院 兒科 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 意外事故之發生

「意外事故」位居兒童死亡原因的前三名，而在眾多意外傷害事件中，又以「跌倒」為首，因為兒童總是精力旺盛、好奇心強及不受約束，所以常在一眨眼間或是一個小疏忽，都會讓孩童受到不必要的傷害。

■ 跌倒之後遺症

因跌倒的程度及部位不同，嚴重程度也有所不同，例如局部擦傷、頭部外傷、顱內出血、肢體骨折、乃至內臟損傷等，故應做好防範措施，確實且正確使用床欄、點滴架及腳凳，限制孩童在病房內或走道上奔跑，以避免孩童意外跌倒。

住院期間維護孩童的安全是很重要的，以下說明孩童在住院期間，設備安全使用上預防跌倒之注意事項。

★預防跌倒，你我有責！

■ 床欄使用安全

■ 時機：當您的視線離開孩童時，請將床欄拉到最高，並下壓確定卡住。

■ 操作方法：

拉起時



同時握住左右兩卡榫，大拇指往內扣，床欄向上拉




床欄採「點對點」方式固定，聽到「喀」表示卡榫固定



下壓床欄，確定床欄已固定

放下時



同時握住左右兩卡榫，大拇指往內扣，床欄向下壓



床欄採「點對點」方式固定，聽到「喀」表示卡榫固定



下壓床欄，點對點對齊聽到「喀」表示已固定

■當孩童坐於床上時



床欄拉高卡好最安全



床欄半拉不好安全



坐在床邊最危險

■ 兒科病床使用注意事項

- 床面「勿」堆疊物品，如：枕頭、棉被，避免踩高攀爬。
- 床頭、床尾非必要時「勿」升起，避免站高攀爬。
- 避免於床上站立、走動、跳躍。
- 常用物品放置於「床旁」，欲拉下床欄餵奶、換尿布前，將用物備妥避免中途離開取物時跌落。
- 床欄已拉至最高，也不可長時間離開床邊或忽略孩童狀況。

★請務必隨時注意孩童狀況避免跌落！

■ 點滴架使用安全

- 請依照護理人員之指導使用點滴架及調整高度，以

■為孩童繫上安全帶，以防滑落或跌倒。



附註：感謝以上可愛的小模特兒及其家長的示範，讓我們的住院環境更加安全

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 小兒科病房轉 5511-3

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 小兒科病房轉 2651

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 小兒科病房轉 8081

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AD100.298.2021.10 八修

■ 輪椅使用安全

使用時請依輪椅借用辦法租借，並先閱讀椅背後方注意事項以保護孩童安全：

- 共有三種尺寸可供選擇，請選擇適合孩童年齡層大小的輪椅。



- 使用前，請先將輪子固定，再將孩童放妥於輪椅上。



固定前



固定後

- 請注意勿讓點滴管路卡到輪椅。

免點滴發生回血、阻塞或滑脫情形。

- 勿讓孩童站立在點滴架上，以避免發生跌倒。
- 孩童欲自行推點滴架活動時，請在旁協助，以免發生意外。
- 點滴架高度之調整方法：



躺下或坐起時
應使紅線與點
滴架呈一直線



抱起或站在床上時，
紅線尾端綠色標示
應拉至卡榫處



紅線彎曲，點滴
易回血造成阻
塞



站立於點滴架
上易滑倒