術後傷口引流管路照護 注意事項

國泰綜合醫院 護理部編印 著作權人:國泰綜合醫院 本著作非經著作權人同意,不得轉載、翻印或轉售

■引流管留置的目的:

- 一般於手術時,醫師會依情況放置引流管,作為 收集滯留於體腔內的體液引流出體外,如血液、淋巴 液、膿液、腹水、膽汁及腸液等,以達到下列目的:
- ■減少對傷口或局部組織的壓迫。
- ■預防感染。
- ■降低引流液對周圍器官的刺激,以促進傷口癒合或達到治療效果。

■注意事項:

- ■預防移位或牽扯:
 - ◆可以使用安全別針夾在病人衣服上或以固定帶懸掛 於床欄,並預留適當長度,方便病人翻身或活動。
 - ◆下床活動時,可使用安全別針將引流袋固定於衣服、繫在腰帶上或綁於腿部。

■維持良好引流功能:建議術後採半坐臥式姿勢以利引流,多翻身,並儘早下床活動;當引流液量達袋子 1/2~2/3 量或充滿空氣時,請通知護理人員協助予以排空。

■預防感染:

- ◆引流處傷口保持乾燥清潔勿潮濕。
- ◆引流袋(瓶)應低於傷口或腰部以下,以避免引流 液逆流回體內。
- ◆引流管若接有引流瓶時,應將瓶身維持站立、不可 打翻。
- ◆避免壓迫及扭曲引流管,勿將引流袋擱置地面。
- ■若有以下情形,請告知護理人員:
 - ◆引流管滑脫。
 - ◆引流量突然減少。
 - ◆傷口出現引流液滲出。
 - ◆敷料滲濕。
 - ◆流出多量鮮紅色液體。
 - ◆傷口出現紅腫熱痛、膿樣分泌物時。
- ■傷口周圍皮膚癢,切勿用手抓癢,改以輕拍方 式,避免感染。

■活動:沒有太多的限制,只要避免引流管受拉扯 即可。

■引流管拔除時機:

當引流液量逐漸減少,並經醫師評估後,會考慮 移除引流管。

祝

早日康復

此資料僅供參考,關於病情實際狀況,請與醫師討論 若有任何疑問,請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5231-5233

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 2951-2953

新竹國泰綜合醫院 (03) 527899 轉 8101-8103

我們將竭誠為您服務!

國泰綜合醫院關心您!

A5000.319.2018.07 二修

2023.01 審閲