

血小板抑制劑用藥須知

國泰綜合醫院 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

血小板抑制劑的作用為抑制血小板凝集，它的作用是降低血液的凝固能力，避免血塊形成而導致血管阻塞，預防心血管及腦血管栓塞。目前常用藥物為Aspirin（伯基）、Clopidogrel（保栓通）、Ticagrelor（百無凝）、Prasugrel（抑凝安）、Cilostazol（普達）、Dipyridamole（待匹力達）。

■ 注意事項

- 因為血小板抑制劑會降低凝血功能，若不正確服用可能造成嚴重出血，請遵照醫師指示劑量服藥，不可擅自調整藥物。
- 出血是血小板抑制劑最常見之副作用，應留意以下症狀：
 - ◆ 嘔吐物帶血，尿液或糞便呈現紅色、黑色或深棕色；請回門診找醫師諮詢。
 - ◆ 流鼻血時間過長，或非月經期的陰道出血。
 - ◆ 傷口出血不易止血，包括刮鬍時的傷口。
 - ◆ 全身皮膚有不明原因的瘀青或出血點。

- ◆刷牙時牙齦出血不止。
- 避免從事容易引起肢體，皮膚受到外傷的活動，以免導致出血；若有頭部受到撞擊伴隨意識改變，請盡速就醫。
- 應小心使用器具，如：刷牙時應使用軟毛牙刷或牙線，以電鬍刀代替刮鬍刀，避免刮傷皮膚或黏膜。
- 服用血小板抑制劑可能會影響胎兒成長，服藥期間應避免懷孕。如發現或有計畫懷孕，應告知您的醫生。
- 接受任何手術或治療（如拔牙），以及其他藥物處方，應先告知醫師正在服用此藥。
- 若有服用中草藥，或其他健康食品，可能會影響藥物作用導致出血，請先諮詢您的醫師。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉5711-5713、5611-5613、
5311-5313

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉2751-2752

新竹國泰綜合醫院 (03) 527899 轉8121-8122、8131-8132

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

A5000.445.2022.09 二修

2023.01 審閱