

# 兒科點滴管路照顧 注意須知


國泰綜合醫院外科部 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院  
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

## ■ 前言

當孩子身體不適，如發燒、腹瀉、嘔吐等情形，經醫師評估後需注射點滴治療，即必須建立靜脈管路。為了減少住院期間因點滴問題造成重新建立靜脈管路，請家屬共同協助照護之責，以達到安全有效的輸液治療。

## ■ 點滴滴注期間注意事項（預防感染發生）

- 抱孩子時，請將點滴滴注液面應高於注射部位約45-60cm，以免管路回血。



- 不可任意調整流速，以免造成傷害。
- 注射部位勿碰水，故不建議洗澡，使用擦澡方式。

- 若靜脈注射針管路建於腳上者，則不建議站立。
- 注射患肢勿全部包住，要露出肢體末梢以利容易觀察。
- 避免孩子拉扯管路造成管路滑出，減少不必要感染。
- 若發現點滴不滴時，應先將注射部位放低，並將點滴架拉高，若仍不滴則通知護理師前來處理。
- 若發現點滴不滴或注射部位腫脹疼痛情形，立即告知護理人員。
- 於更換衣物時，可請護理師協助，以避免靜脈管路回血與阻塞。
- 推動點滴架或使用輪椅時，應避免點滴管路捲入輪子，而發生管路脫落。
- 移動點滴架時，請將手放置在卡榫之上或下，勿直接握住卡榫，以避免造成點滴架高度突然下降。



- 勿讓幼童站在點滴架底座，避免跌倒。
- 點滴滴注時若孩子有任何不適或哭鬧不止，且輸注部位上方皮膚蒼白、腫脹、滲漏情形，請立刻通知護理師。

## ■ 點滴滲漏症狀

- 注射部位疑似滲水（滲血）、浸潤、發炎、腫脹情形。
- 針頭皮膚處發紅及觸摸有腫脹、疼痛的徵象。
- 點滴肢體之膚色有否變蒼白或發紫及觀察血循環冰冷。



## ■ 住院期間照護方式

- 一般有靜脈管路時，護理人員將於滴注每 4 小時會觀察是否有滲漏、發紅及觸摸有否腫脹、疼痛的徵象，並會主動和家屬說明評估結果。

- 若以點滴輸液幫浦控制滴速，護理人員將於滴注每 2 小時密切觀察是否有滲漏、發紅及觸摸有否腫脹、疼痛的徵象，並會主動和家屬說明評估結果。
- 若孩子有使用抗生素治療時，護理人員於每班（包含大夜班）加抗生素時將會叫醒家屬，一起看點滴入針處無紅腫滲漏後再加藥。
- 點滴滲漏的處理-
  1. 立即停止輸液注射。
  2. 移除注射針。
  3. 擦拭及處理外滲藥液。
  4. 需要時使用生理食鹽水中和組織中外滲藥液。
  5. 抬高點滴滲漏肢端，促進血液循環。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5501-5502

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 8101-8102

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 2651-2653

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！