鉺雅鉻雷射治療後須知

國泰綜合醫院 醫學美容中心編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■什麼是鉺雅鉻雷射?可治療哪些皮膚色素?

鉺雅鉻雷射是新近發展的雷射機種之一。所放出的雷射光直接作用在表皮，能量吸收之後，可瞬間汽化皮膚組織，達到治療的目的。臨床上可處理皮膚角化、增生、贅疣及凹洞磨平。雷射後傷口較傳統二氧化碳雷射處理的癒合快，術後的紅斑恢復亦較快。

■雷射治療後皮膚狀況?

- ■雷射治療後，患部會有微量流血、短暫的變紅、微微灼熱疼痛感，皆為正常現象。若有灼熱感可冰敷減輕不適，這輕微不適感就會慢慢地消失。
- ■雷射後會有結痂產生，約 7～10 天會脫落，切勿用手指摳抓。
- ■痂皮脫落後，治療部位會呈淡紅色，等二、三週後有些人會變成咖啡色，並非表示治療無效，這是暫

時性色素沉著，無需擔心。大約一、二個月後見漸漸變淡。有些特殊膚質的人，需要半年，勿需緊張。

- 因為治療或局部麻醉的影響，治療後數小時或數日內，治療部位會有浮腫的現象，會自行消退。

如何照顧治療部位？

- 治療部位如在眼睛周圍，造成皮膚浮腫，可以冰敷患部或用力做眼皮睜閉運動減輕浮腫。
- 雷射治療部位在痂皮脫落前，不宜碰水。
- 換藥方法：
  - 以棉花棒沾少許生理食鹽水，將傷口上的血跡及舊藥膏輕輕擦掉。
  - 用另一支乾淨花棒擦乾傷口。
  - 再用另一支乾淨棉花棒在傷口處塗上一層薄薄藥膏。
  - 早晚各換藥一次。
- 結痂應讓其自行脫落，切勿自行剝除。
- 結痂未脫落前，不可用任何保養品。結痂脫落後即可恢復平常的保養工作。

- 治療後 3 個月至半年內應嚴格防曬，且白天外出（含下雨天）宜使用防曬係數(SPF)50 以上之防曬產品及使用遮陽工具為佳。
- 治療後約 7～10 天〈結痂脫落後〉，請來電預約複診時間。

- 本項處置健保不給付，需以自費接受處置，處置發生之費用均以當次為限，如需再次處置時，費用將另行採計。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院	(02)27082121	轉 5591
新竹國泰綜合醫院	(03)5278999	轉 2666
汐止國泰綜合醫院	(02)26482121	轉 3430

我們將竭誠為您服務！
國泰綜合醫院關心您！

AJ100.532.2023.06 初訂