

鉅雅銘雷射治療後須知

國泰綜合醫院 醫學美容中心編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■什麼是鉅雅銘雷射?可治療哪些皮膚色素?

鉅雅銘雷射是新近發展的雷射機種之一。所放出的雷射光直接作用在表皮，能量吸收之後，可瞬間汽化皮膚組織，達到治療的目的。臨床上可處理皮膚角化、增生、贅疣及凹洞磨平。雷射後傷口較傳統二氧化碳雷射處理的癒合快，術後的紅斑恢復亦較快。

■雷射治療後皮膚狀況?

- 雷射治療後，患部會有微量流血、短暫的變紅、微微灼熱疼痛感，皆為正常現象。若有灼熱感可冰敷減輕不適，這輕微不適感就會慢慢地消失。
- 雷射後會有結痂產生，約7~10天會脫落，切勿用手指摳抓。
- 痂皮脫落後，治療部位會呈淡紅色，等二、三週後有些人會變成咖啡色，並非表示治療無效，這是暫

時性色素沉著，無需擔心。大約一、二個月後見漸漸變淡。有些特殊膚質的人，需要半年，勿需緊張。

■因為治療或局部麻醉的影響，治療後數小時或數日內，治療部位會有浮腫的現象，會自行消退。

■如何照顧治療部位？

■使用人工皮注意事項

- ◆若外觀呈現乳白色大於傷口範圍並溢出覆蓋處時表示已吸滿傷口滲液，即需更換。
- ◆請用生理食鹽水沾濕棉花棒，輕拭傷口及周圍皮膚，去除滲液及分泌物。
- ◆視傷口大小，將人工皮裁剪大於傷口1公分左右，移除透明背膠，將黏性處貼向傷口。
- ◆用手按壓黏貼部位，讓人工皮和皮膚達最佳黏合
- ◆建議人工皮最長貼 3-7 天即需更換，使用後如有紅腫之過敏現象，請暫時停止使用。
- ◆如人工皮覆蓋傷口處，外觀呈現乾燥狀，表示已逐漸癒合，可不需更換，待其自然掉落。

◆人工皮注意事項 QR-code



■ 使用藥膏方法：

- ◆ 以棉花棒沾少許生理食鹽水，將傷口上的血跡及舊藥膏輕輕擦掉。
- ◆ 用另一支乾淨花棒擦乾傷口。
- ◆ 再用另一支乾淨棉花棒在傷口處塗上一層薄薄藥膏。
- ◆ 早晚各換藥一次。
- ◆ 結痂應讓其自行脫落，切勿自行剝除。
- ◆ 結痂未脫落前，不可用任何保養品。結痂脫落後即可恢復平常的保養工作。
- ◆ 雷射治療部位在痂皮脫落前，不宜碰水。
- ◆ 藥膏使用注意事項 QR-code



- 治療後3個月至半年內應嚴格防曬，且白天外出(含下雨天)宜使用防曬係數(SPF)50以上之防曬產品及使用遮陽工具為佳。

■本項處置健保不給付，需以自費接受處置，處置發生之費用均以當次為限，如需再次處置時，費用將另行採計。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5591

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2666

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3430

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AJ100.532.2024.05 一修