

鈷雅銘雷射治療後須知

國泰綜合醫院 醫學美容中心編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■鈷雅銘雷射的原理

利用 S.P.T.選擇性光熱分解原理，提供 532nm 及 1064nm 兩種波長，532nm 對表淺性色素斑效果佳；而 1064nm 波長可深入真皮層治療深層斑、除刺青。

■治療間隔與次數

表淺性色素斑治療 1-2 次即可消除，而較深層的色素斑及刺青則需要較多次(約 2-5 次)的治療。色素斑的治療非立即見效，有些病變需多次數的治療才會完全清除，請持續遵循醫囑安排療程，醫師會視傷口修復的情況決定下次治療的時間，一般約 1-2 個月再作第二次，請定期治療，才能有最佳的效果。

■治療後皮膚反應

■治療後 2-3 分鐘：會輕微紅腫(部分會有少許出血)，並稍有灼熱感當天就會消退，可依處方冷敷傷口。

- 第 1-3 天：傷口開始形成暗棕色痂皮，此時切勿用手摳除，以免感染造成疤痕，應讓其自行脫落。
- 第 3-7 天：痂皮開始自然脫落。
- 第 1-3 週：脫落後傷口為淡粉紅色，此為新生皮膚的顏色。

■反黑

少數的人色素斑在治療 3-4 週後，傷口會轉為深棕色，此為正常的暫時性返黑現象，並非治療無效，只要重視治療後的護理，約 90% 的人反黑情形都會在 1-2 個月開始逐漸淡化，約需 3-6 個月的時間回覆接近至正常膚色。

■眼周浮腫

治療部位如在眼睛周圍，造成眼皮浮腫，可以冰敷患部或用力做眼皮睜閉運動減輕浮腫。

■如何照顧治療部位？

■使用人工皮注意事項

- ◆若外觀呈現乳白色大於傷口範圍並溢出覆蓋處時表示已吸滿傷口滲液，即需更換。

- ◆請用生理食鹽水沾濕棉花棒，輕拭傷口及周圍皮膚，去除滲液及分泌物。
- ◆視傷口大小，將人工皮裁剪大於傷口 1 公分左右，移除透明背膠，將黏性處貼向傷口。
- ◆用手按壓黏貼部位，讓人工皮和皮膚達最佳黏合
- ◆建議人工皮最長貼 3-7 天即需更換，使用後如有紅腫之過敏現象，請暫時停止使用。
- ◆如人工皮覆蓋傷口處，外觀呈現乾燥狀，表示已逐漸癒合，可不需更換，待其自然掉落。
- ◆人工皮注意事項 QR-code



■使用藥膏方法：

- ◆以棉花棒沾少許生理食鹽水，將傷口上的血跡及舊藥膏輕輕擦掉。
- ◆用另一支乾淨花棒擦乾傷口。
- ◆再用另一支乾淨棉花棒在傷口處塗上一層薄薄藥膏。
- ◆早晚各換藥一次。
- ◆結痂應讓其自行脫落，切勿自行剝除。
- ◆結痂未脫落前，不可用任何保養品。結痂脫落後即可恢復平常的保養工作。

- ◆雷射治療部位在痂皮脫落前，不宜碰水。
- ◆藥膏使用注意事項 QR-code



■ 臉部保養

結痂未脫落前(約 7 天)，暫時不可用任何保養品、磨石膏及做臉；待結痂脫落後即可恢復日常保養。

■ 防曬

治療後 3 個月至半年內應嚴格防曬，且白天外出（含下雨天）宜使用防曬係數(SPF)50 以上之防曬產品及使用遮陽工具為佳。

- 本項處置健保不給付，需以自費接受處置，處置發生之費用均以當次為限，如需再次處置時，費用將另行採計。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5591

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2666

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3430

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AJ100.535.2024.05 一修