隆乳手術注意事項

國泰綜合醫院 醫學美容中心編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■換藥方法

■覆蓋紗布

- ◆以棉花棒沾少許生理食鹽水，將傷口上的血跡及舊藥膏輕輕擦掉。
- ◆用另一支乾淨棉花棒擦乾傷口。
- ◆再用另一支乾淨棉花棒在傷口處塗上一層抗生素藥膏，並以紗布覆蓋。。
- ◆一日換藥一次。

■使用防水膠貼片

患處可沖澡，但不可泡澡，若無浸潤情形則無需更換，直至拆線日止。

■使用組織膠

24 小時候可拆除紗布，無須覆蓋並可淋浴切勿泡澡，亦則無需換藥。

■口服依醫囑藥使用(勿空腹服用)

- 抗生素務必服用完畢：共__5__日，一日__2__次，每次__1__顆。
- 止痛藥：一日__3__次，每次__1__顆。
  或必要時，每 4 至 6 小時__1__顆。
- 消腫藥：一日__3__次，每次__1__顆。

■注意事項

- 腋下或乳暈植入義乳模型，傷口疼痛程度因人而異，一般 3 至 5 天後，疼痛會逐漸緩解。
- 引流管留置與否係根據手術時出血情況而定，故須遵照醫師指示拔除引流管，通常為手術後一至三天拔除引流管。
- 術後胸部將以彈性繃帶固定數日，以防止腫脹或出血。
- 需拆線者傷口不可碰水，避免感染發生。
- 禁食酒、辣椒、咖啡、茶葉及禁煙(包含二手煙)。
- 胸罩的穿著依醫師視患者情況指示，原則上六個月內勿穿有鋼絲胸罩，若為外出方便可暫時穿著小可愛或柔軟無鋼絲胸罩。

- 術後一週避免碰撞、抱小孩、提重物、三溫暖、游泳。
- 傷口若有出血不止、異常腫痛，或任何問題，請電話連絡或回院就診；若遇下班時間，請至急診處就診。
- 手術後滿一個月時，仍需回診檢查；期間若有血腫、異常劇痛、乳房變硬可先電話聯絡安排就診。

- 術後請依約返診

- 本項處置健保不給付，需以自費接受處置，處置發生之費用均以當次為限，如需再次處置時，費用將另行採計。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院	(02)27082121	轉	5591
新竹國泰綜合醫院	(03)5278999	轉	2666
汐止國泰綜合醫院	(02)26482121	轉	3430

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AJ100.543.2023.06 初訂
2025.04 審閱