

血小板濃縮液注射(PRP)

治療後注意事項

國泰綜合醫院 醫學美容中心編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■作用原理

讓患者藉由抽血的方式，將血液放置特製試管內，讓試管在離心機中高速旋轉，PRP 為血液中分離過程得到的分離物。高濃度富含血小板的血漿內具有儲存與釋放多種生長因子的作用，提供自我修復的原料，可幫助組織再生及填充缺損，具有減少軟骨細胞壞死磨損和抗發炎減緩疼痛等功能，藉由注射發炎部位，來加速治療，須由注射訓練過的醫師使用。

■術後照護

- 注射後難免有些微出血或瘀青現象，24 小時內請勿劇烈運動、請盡量保持休息靜止狀態。
- PRP 注射後可能會有脹痛感，可適度清潔及冰敷。
- PRP 注射後三天可正常活動，請於兩周後回診。

■ 禁忌症

(沒有任何治療是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出)

- 嚴重吸煙，吸毒和飲酒史的患者。
 - 血小板功能障礙綜合症狀、血小板減少症、低纖維蛋白原血症。
 - 血液動力學不穩定。
 - 敗血症，急性和慢性感染。
 - 慢性肝病者。
 - 接受抗凝血療法者。
 - 慢性皮膚病。
 - 癌症、代謝和全身性疾病者。
- 治療次數及治療間隔時間仍需依照每個人的身體狀況、施打部位、醫師的技術等會有所不同。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5591

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2666

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3430

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AJ100.550.2023.06初訂

2024.05 審閱