高頻電波刀治療注意事項

國泰綜合醫院 醫學美容中心編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■適應症

- ■表淺皮膚痣
- ■疣

■作用原理

經電極尖端發出 3.8MHz 之高頻電波，於接觸組織後，由於組織本身之阻抗，吸收此高頻電波而產生高熱以達到切割與凝結的效果。

■治療部位照顧

- ■塗抹藥膏方法
  - ◆棉花棒沾少許生理食鹽水，將傷口上的血跡、 分泌物及舊藥膏輕輕擦拭掉。
  - ◆再用另一支乾淨棉花棒在傷口處塗上薄薄一層藥膏。

- 早晚各換藥一次。
- 傷口前三天應避免碰到水，若不小心浸濕傷口請自行換藥。
- 自行換藥至結痂脫落即可停止。
- 傷口結痂一般約 5-10 天會自行脫落，勿用手摳。
- 生理食鹽水請每日更換一瓶使用。

■更換人工皮

- 若外觀呈現乳白色大於傷口範圍並溢出覆蓋處時表示已吸滿傷口滲液，即需更換。
- 請用生理食鹽水沾濕棉花棒，輕拭傷口及周圍皮膚，去除滲液及分泌物。
- 視傷口大小,將人工皮裁剪大於傷口 1 公分左右，移除透明背膠，將黏性處貼向傷口。
- 用手按壓黏貼部位，讓人工皮和皮膚達最佳黏合
- 建議人工皮最長貼 3-7 天即需更換，使用後如有紅腫之過敏現象，請暫時停止使用。
- 如人工皮覆蓋傷口處，外觀呈現乾燥狀，表示已逐漸癒合，可不需更換，待其自然掉落。

結痂脫落後照護

- 預防色素沉澱，須防曬至少 2-3 個月，外出時請塗防曬係數(SPF)50 以上防曬產品及使用遮陽工具為佳。
- 痂皮脫落前切忌使用其他藥物或化妝品。

本項處置健保不給付，需以自費接受處置，處置發生之費用均以當次為限，如需再次處置時，費用將另行採計。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院	(02)27082121	轉 5591
新竹國泰綜合醫院	(03)5278999	轉 2666
汐止國泰綜合醫院	(02)26482121	轉 3430

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AJ100.552.2023.06 初訂