

伊蓮絲注射治療注意事項

國泰綜合醫院 醫學美容中心編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■作用原理

此為 30%PCL (polycaprolactone，聚己內酯微粒子) + 70%CMC (凝膠載體) 所組成。注射後，CMC 凝膠提供立即性填充效果改善面部皺摺或凹陷，且刺激纖維母細胞產生新的膠原蛋白來維持皮膚的光滑、細緻與彈性。

■處置效益

能夠幫助撫平面部的凹陷與紋路，能夠顯著改善中重度皺紋與紋路，例如：法令紋、木偶紋、抬頭紋。

■治療前須注意事項

- 確認與醫師做好預期效果以及術後保養的溝通。
- 當天不要化妝、三溫暖、喝酒、辛辣等食物。
- 對藥物過敏者、餵母乳者、懷孕，不能施打。
- 服用阿斯匹靈或類似藥物，有注射瘀青或流血可能。

■治療後照護

- 常熬夜、抽菸、喝酒，會消失得較快。
- 一週內避免做果酸換膚等療程。
- 請勿按壓施打部位。
- 請勿暴露注射區域在極熱(三溫暖或日光浴)或極冷的地方(如游泳等)。
- 切勿使用熱水洗臉，可輕微卸妝。
- 有很少的可能該部位會瘀青或是微紅，通常 1~2 天會消退。
- 有服用阿斯匹靈或其他類似藥物者，會增加注射區域瘀青或流血可能性。
- 注射後一週內可回診，視察注射後效果。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5591

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2666

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3430

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AJ100.553.2023.07 初訂

2024.05 審閱