

# 玻尿酸注射注意事項

國泰綜合醫院 醫學美容中心編印 著作權人：國泰綜合醫院  
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

## ■作用原理

玻尿酸皮下植入物注射劑為無菌性凝膠，為藉由微生物發酵或動物來源萃取而得，其作用原理是運用增加皮膚或嘴唇的容積，因此可重建皮膚的輪廓或增加嘴唇的豐盈程度。

## ■處置效益

修飾臉部肌膚紋路、皺紋、皺摺、豐唇及修飾臉部輪廓，將適量玻尿酸皮下植入物注射劑，精確注入臉部的數個部位。

## ■注射後注意事項

■隔天可正常清潔及輕微的卸妝。應避免暴露在高溫或強光下（如泡澡、溫泉、三溫暖、日光浴室、日光浴或極冷處）。

- 緊繃感及輕微腫脹疼痛約 3 至 5 天，是正常現象，通常幾天後消失。
- 如有持續嚴重泛白、劇烈疼痛、皮膚壞死，請立即回診檢視。
- 輕微紅、腫脹、搔癢及有微硬的觸感是注射後會有的正常現象，通常幾天後消失。
- 曾有少數個案產生眉間壞死、膿瘍形成、肉芽腫以及立即性或遲發性過敏的症狀，請立即就醫。
- 曾經有臉部皰疹的問題，扎針處會有引發皰疹復發的危險性。
- 如有用阿斯匹靈或其他類似藥物，易使注射部位增加淤青血腫及流血。
- 曾有極少數發生失明與中風，如有視力模糊、口齒不清或半邊臉部麻痺等症狀產生，請立即就醫。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5591

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2666

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3430

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AJ100.554.2023.07 初訂

2024.05 審閱