

草莓型血管瘤口服藥物 治療注意事項

國泰綜合醫院 醫學美容中心編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

- 藥物磨粉是根據嬰孩體重計算，一天_____次服用，需每月返診調整劑量。
- 如忘記服藥或不確定是否服藥，切勿補吃避免服用過量。
- 服用方法：請將藥粉溶於 10-15cc 配方奶或母乳中喝完，勿將藥粉泡製於整瓶奶中，避免沒喝完造成藥量不足。
- 首次服用劑量會較輕，目的是觀察嬰孩對藥物有無副作用之反應，如在服用第一週有下列症狀時，請停止用藥並回診追蹤：
 - ◆ 活動力減退、嗜睡
 - ◆ 食慾減退
 - ◆ 手腳冰冷
 - ◆ 噁心嘔吐

◆呼及急促大聲

◆呼吸咻咻聲

■若嬰孩有感冒症狀，如咳嗽、鼻塞、喘、明顯的痰，請暫停服用，待感冒症狀完全改善後再開始服用。

如無法確定時請詢問小兒科醫師後再繼續用藥。

■服用藥物期間並不影響預防接種注射，故不需打針前停藥。

■請依約返診

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5591

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2666

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3430

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AJ100.569.2023.07 初訂

2025.04 審閱