成人點滴管路照顧
注意須知

國泰綜合醫院內科 護理科編印 著作權人:汐止國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■前言

靜脈輸液治療是住院病人最常見的醫療處置，可提供藥物輸液、電解質、水份及營養等，經醫師評估後需注射點滴治療，即必須建立靜脈管路。為了減少住院期間因點滴問題造成重新建立靜脈管路，請共同協助照護之責，以達到安全有效的輸液治療。

■點滴滴注期間注意事項（預防感染發生）

- 請將點滴滴注液面應高於注射部位約45~60cm，以免管路回血。
- 勿任意調整流速，以免造成傷害。
- 注射部位勿碰水，建議洗澡使用擦澡方式
- 若靜脈注射針管路建於腳上者，則盡量減少注射部位活動。
- 注射患肢勿全部包住，要露出肢體末梢以利容易觀察。

- 避免拉扯管路造成管路滑出，減少不必要感染。
- 若發現點滴不滴時，應先將注射部位放低，若仍不滴則通知護理師前來處理。
- 於更換衣物時，可請護理師協助，以避免靜脈管路回血與阻塞。
- 推動點滴架或使用輪椅時，應避免點滴管路捲入輪子，而發生管路脫落。
- 移動點滴架時，請將手放置在卡榫之上或下，勿直接握住卡榫，以避免造成點滴架高度突然下降。

點滴滲漏症狀

若發現以下情形，立即告知護理人員。

- 注射部位疑似滲水（滲血）、浸潤、發炎、腫脹情形。
- 針頭皮膚處發紅及觸摸有腫脹、疼痛的徵象。
- 點滴肢體之膚色有否變蒼白或發紫及觀察血循變冰冷。

點滴滲漏及靜脈炎的處理

- 立即停止輸液注射。
- 移除注射針。

■擦拭及處理外滲藥液。

■需要時使用生理食鹽水中和組織中外滲藥液。

■抬高點滴滲漏肢端，促進血液循環。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院	(02)27082121	轉 5611-5613
新竹國泰綜合醫院	(03)5278999	轉 8131-8132
汐止國泰綜合醫院	(02)26482121	轉 2701-2702

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

D5000.571.2023.11 初訂