


# Decapeptyl 弟凱得 注射針



## 弟凱得

需要準備: 弟凱得注射針兩盒 內容物各含預填式注射針兩隻 及請準備酒精棉片一片

- 1.使用之前請先將雙手洗淨擦乾避免感染
- 2.確認粉紅色單上藥品種類、施打劑量及施打時間  
**破卵針的施打時間很重要關連到取卵時間是經過計算的，不可以任意更改**
- 3.將藥劑從冰箱冷藏處拿出並將桌面清潔淨空以便於施打
- 4.參考下方施打步驟施打藥劑
- 5.施打完畢後於粉紅單上註記標示已施打
- 6.請將使用完畢的注射針拿至本中心回收



01. 水平拔開針蓋，使用雙手握住針筒推桿先下拉後再慢慢上推內桿直到一滴水珠流出



02. 將針尖輕輕蓋上蓋子，平放於桌面上，並準備酒精棉片



03. 注射區域為下腹部，肚臍下5公分（三橫指）範圍內，左邊右邊皆可以施打



04. 捏緊注射區域使用酒精棉片由內而外的消毒注射區域



05. 手腕輕靠肚皮當軸心垂直入針，針頭全沒入皮下後慢慢將藥推入，不鬆開推桿停留皮下2~5秒後拔出即完成注射。



06. 使用酒精棉片輕壓注射區域，不需要揉

國泰綜合醫院生殖醫學中心

臺北市仁愛路四段280號3樓(國泰醫院本館3樓)

Tel : 02-27082121 #3557

電話諮詢時間：8:30-12:00 / 13:30-17:00