

# Ovidrel 克得諾 破卵針



## 克得諾

需要準備: 克得諾注射針一盒 內容物含預填式注射針一隻 酒精棉片一片

1. 使用之前請先將雙手洗淨擦乾避免感染
2. 確認粉紅色單上藥品種類、施打劑量及施打時間
3. 將藥劑從冰箱冷藏處拿出並將桌面清潔淨空以便於施打
4. 參考下方施打步驟施打藥劑
5. 施打完畢後於粉紅單上註記標示已施打
6. 請將使用完畢的注射針拿至本中心回收



使用**0.5支**藥物劑量的使用方式

先排出前端0.5支劑量不使用

預留後端0.5支劑量施打肚皮


**0.5 半支劑量施打，水平拔開針蓋，使用雙手握住針筒推桿先下拉後再慢慢上推排出0.5支劑量**



使用**1支**藥物劑量的使用方式

排出空氣至一滴液體出現於尖端

**01.整支完整劑量施打，水平拔開針蓋，使用雙手握住針筒推桿先下拉後再慢慢上推內桿直到一滴水珠流出**



**02. 將針尖輕輕蓋上蓋子，平放於桌面上，並準備酒精棉片**



**03. 注射區域為下腹部，肚臍下5公分（三橫指）範圍內，左邊右邊皆可以施打**



**04. 捏緊注射區域使用酒精棉片由內而外的消毒注射區域**



**05. 手腕輕靠肚皮當軸心垂直入針，針頭全沒入皮下後慢慢將藥推入，不鬆開推桿停留皮下2~5秒後拔出即完成注射。**



**06. 使用酒精棉片輕壓注射區域，不需要揉**

**國泰綜合醫院生殖醫學中心**

臺北市仁愛路四段280號3樓(國泰醫院本館3樓)

Tel : 02-27082121 #3557

電話諮詢時間：8:30-11:00 / 13:30-16:00