

Crinone 快孕隆 陰道凝膠




需要準備: 快孕隆陰道凝膠一支


1. 使用之前請先將雙手洗淨擦乾避免感染
2. 確認黃色醫囑單上藥品種類、使用劑量及時間
3. 將藥劑從冰箱冷藏處拿出於室溫下回溫以方便使用
4. 參考下方步驟使用藥劑
5. 使用完畢後於黃色醫囑單上註記標示已使用
6. 使用後塑膠給藥器請直接丟棄即可



01. 請由較厚的一端撕開外包



02. 手捏著尾端平行取出



03. 緊握給藥器並輕甩兩下讓藥品集中於前端細端



04. 將前端的塑膠頭扭轉下來



05. 輕輕地將給藥器的細端放入陰道中，壓扁後端空氣囊使藥劑進入陰道內，不鬆開持續壓扁停留約2~5秒後取出，待完全取出陰道後才鬆開空氣囊



06. 塞完快孕隆後建議可以走動透過活動摩擦、體溫，促進藥物吸收



05. 多餘的藥物會變成藥渣殘留在陰道壁，可以每2-3天進行一次。將手洗乾淨後，清潔陰道壁上的藥渣，可加強後續藥物的吸收。

國泰綜合醫院生殖醫學中心

臺北市仁愛路四段280號3樓(國泰醫院本館3樓)

Tel : 02-27082121 #3557

電話諮詢時間：8:30-12:00 / 13:30-17:00