

Arixtra 愛栓通 (肝素)



需要準備: Arixtra 愛栓通 一支 酒精棉片一片

1. 使用之前請先將雙手洗淨擦乾避免感染
2. 確認黃色醫囑單上藥品種類、施打劑量及施打時間
3. 將桌面清潔淨空以便於施打
4. 參考下方施打步驟施打藥劑
5. 施打完畢後於黃色醫囑單上註記標示已施打
6. 請將空針頭用不易刺穿的容器收集拿至本中心回收

***請注意* 此藥物室溫儲存請勿放入冰箱**



01. 以逆時針方向旋轉針頭護套。



02. 再以直線的方式拉開蓋子。



針尖輕輕蓋上蓋子後平放

03. 將針尖輕輕蓋上蓋子，平放於桌面上，並準備酒精棉片 (無須移除注射液內小氣泡，會使藥物流失)。



04. 注射區域為下腹部，肚臍下5公分 (三橫指) 範圍內，左邊右邊皆可以施打。



05. 捏緊注射區域使用全新酒精棉片由內而外的消毒注射區域。



慢慢推入藥物，並停留幾秒

06. 垂直入針，針頭全沒入皮下後慢慢將藥推入，直到注射完所有內容物。



安全針頭將自動收回

07. 注射完從皮下拔針後才釋放推桿，針頭將自動抽出返回到安全套管中鎖定。



08. 使用酒精棉片輕壓注射區域，不需要揉。

國泰綜合醫院生殖醫學中心

臺北市仁愛路四段280號3樓(國泰醫院本館3樓)

Tel : 02-27082121 #3557

電話諮詢時間：8:30-12:00 / 13:30-17:00