

商品名：克瘤康膠囊

(Calquence®)

學名：Acalabrutinib

規格與劑量：100 毫克/粒



● 臨床用途：

● 被套細胞淋巴瘤（MCL）

先前曾接受至少一種治療的被套細胞淋巴瘤（Mantle Cell Lymphoma, MCL）成年病人。

● 慢性淋巴球性白血病（CLL）或小淋巴球性淋巴瘤（SLL）

慢性淋巴球性白血病（Chronic lymphocytic leukemia, CLL）或小淋巴球性淋巴瘤（Small lymphocytic lymphoma, SLL）成年病人。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 有嚴重感染的可能性，應留意並回報感染的徵象或症狀。
- 3 應留意並回報出血的徵象或症狀。接受重大手術可能需要中斷acalabrutinib。
- 4 在使用acalabrutinib治療期間，需要定期做血液檢查，以檢查血球計數。
- 5 在曾經接受acalabrutinib治療的病人中曾有其他惡性腫瘤發生，包

括皮膚癌和其他實體固態瘤。須注意防曬措施。

- 6 應留意並回報任何心悸、頭暈、昏厥、胸部不適和呼吸急促的徵象。
- 7 可能導致胎兒危害和難產。指示具生育能力之婦女在治療期間以及在最後一次服用acalabrutinib後至少1週內應採用有效避孕措施。
- 8 哺乳婦女在acalabrutinib治療期間以及服用最後一次劑量後至少2週內不要哺餵母乳。
- 9 口服acalabrutinib每天兩次，大約間隔12小時。Acalabrutinib可與食物或不與食物一起服用。Acalabrutinib膠囊應該用一杯水整粒吞服，不要打開、弄破或咀嚼膠囊。
- 10 忘記服用acalabrutinib，可以在正常服藥時間後3個小時內補服。如果已經超過3小時，就應指示他們跳過該次劑量，並在常規時間服用下一劑。不可以額外服用膠囊來彌補錯過的劑量。
- 11 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書, ASCEND 試驗)

✓ ≥15%

感染、嗜中性白血球減少、貧血、血小板減少、淋巴球增多、頭痛、腹瀉、出血、疲勞、肌肉骨骼疼痛...等。

✓ <15%

瘀傷、皮疹、第二原發惡性腫瘤、非黑色素瘤皮膚癌、關節痛、心房顫動或心房撲動、高血壓、皰疹病毒感染...等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ 過敏反應，如皮膚紅疹、癢、臉或嘴唇或舌頭腫脹、胸悶、呼吸困難。
- ✓ 尿液顏色深或糞便蒼白、噁心、嘔吐、食慾不振、胃痛、皮膚或眼睛發黃。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- ✓ 心跳加速、劇烈或不規則、昏厥、頭暈。
- ✓ 發燒、寒顫、咳嗽、流鼻水或鼻塞、喉嚨痛、身體疼痛。
- ✓ 不正常出血、瘀血或虛弱。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 腹瀉。
- ✓ 頭痛。
- ✓ 肌肉或關節疼痛。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。