


商品名：欣覓力膜衣錠

(Scemblix®)

學名：Asciminib

規格與劑量：40 毫克/粒



● 臨床用途：

- 治療新診斷的慢性期費城染色體陽性之慢性骨髓性白血病(Ph+ CML-CP)成人病人。
- 治療曾接受酪胺酸激酶抑制劑治療的慢性期費城染色體陽性之慢性骨髓性白血病(Ph+ CML-CP)成人病人。
- 治療慢性期費城染色體陽性且帶有 T315I 突變之慢性骨髓性白血病 (Ph+CML-CP with T315I mutation) 成人病人。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有肝、腎功能不全病史；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 應以餐前口服方式使用 Scemblix，且不應與食物併服。服用 Scemblix 至少 2 小時前和服用 1 小時後，應避免進食。
- 3 每日一次治療劑量：如果漏服 Scemblix 劑量超過大約 12 小時，則應跳過該劑量並按計畫服用下一劑。
- 4 每日兩次治療劑量：如果漏服 Scemblix 劑量超過大約 6 小時，則應跳過該劑量並按計畫服用下一劑。

- 5 在開始接受 Scemblix 治療之前，應驗證具有生育能力女性的懷孕狀況。
- 6 有性生活且具生育能力的女性，在 Scemblix 治療期間與最後一劑後至少 7 天內應使用有效的避孕方式(可使懷孕率少於 1% 的方法)。
- 7 在 Scemblix 治療期間與最後一劑後至少 7 天內不建議哺乳。
- 8 在開始使用 Scemblix 治療之前進行心電圖檢查，並在治療期間視臨床需要進行監測。在服用 Scemblix 之前，應先校正低鉀血症和低鎂血症，並在治療期間視臨床需要進行監測。
- 9 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書 ASC4FIRST)

✓ **≥10%**

肌肉骨骼疼痛、皮疹、疲倦、腹瀉、腹痛、上呼吸道感染、血脂異常、頭痛...等。

✓ **<10%**

關節痛、便秘、噁心、高血壓、咳嗽、搔癢、發燒、嘔吐、頭暈、水腫、蕁麻疹、心律不整、流感、週邊神經病變、肺炎、呼吸困難、胰臟炎、視力模糊、發燒性嗜中性白血球減少症、心悸...等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，如皮膚紅疹、癢、臉或嘴唇或舌頭腫脹、胸悶、呼吸困難。
- ✓ 暈厥、頭暈、頭昏眼花。
- ✓ 胸痛、呼吸困難、咳血、疲倦。
- ✓ 心律不整。
- ✓ 發燒、寒顫、咳嗽、流鼻水或鼻塞、喉嚨痛、全身酸痛。
- ✓ 手臂或腿部，或身體一側出現麻木或無力，小腿疼痛。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- ✓ 關節、肌肉或骨骼疼痛。
- ✓ 體重迅速增加、手、腳踝或腳腫脹。
- ✓ 突發性劇烈胃痛、噁心、嘔吐。
- ✓ 突發或劇烈頭痛、視力障礙、言語障礙或行走障礙。
- ✓ 異常出血、瘀血或虛弱。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 腹瀉。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。