商品名：癌能畢膜衣錠

(Alunbrig®)

學名：Brigatinib

規格與劑量：30 毫克/粒

## ● 臨床用途：

適用於治療 ALK 陽性的晚期非小細胞肺癌(NSCLC)病人。

## ● 注意事項：

1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有心血管病史；肝功能不全；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。

2 若出現呼吸道症狀惡化，請聯絡醫師。

3 Brigatinib治療期間應定期監測血壓、血糖和心跳速率。

4 發生任何視力症狀都應就醫。

5 出現任何不明原因的肌肉痛、觸痛或無力，都應就醫。

6 應建議病人在服用 Brigatinib時避免長時間暴露在陽光下，並在停止治療後持續至少 5 天。在戶外時，應建議病人戴上帽子和防護衣物，並使用廣波長紫外線 A (UVA)/紫外線 B (UVB) 防曬乳和護唇膏 (SPF ≥30) 以幫助防止潛在的曬傷。

7 患有半乳糖不耐症、乳糖酶完全缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良之罕見遺傳問題的病人不應使用本品。

8 懷孕女性若使用Brigatinib會造成胎兒損傷。

9 建議哺乳女性在Brigatinib治療期間和最後一劑後1週不應哺乳。

10 建議具有生育能力的女性在Brigatinib治療期間與最後一劑後至少4個月內使用有效的避孕措施。

11 建議男性在Brigatinib治療期間與最後一劑後至少3個月使用有效的避孕措施。

12 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

## ● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

| ✓ **極常見(≥1/10)** |
|---|
| 肺炎、上呼吸道感染、貧血、淋巴球計數減少、白血球計數減少、高血糖、食慾減低、頭痛、周邊神經病變、暈眩、視力障礙、高血壓、咳嗽、呼吸困難、便秘、腹瀉、嘔吐、AST升高、ALT升高、皮疹、肌痛…等。 |
| ✓ **常見(≥1/100，<1/10)** |
| 血小板計數減少、失眠、味覺障礙、心搏過緩、心搏過速、心電圖 QT 延長、非感染性肺炎、光敏感反應、胸部不適…等。 |

### 如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

✓ **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

✓ 視力模糊。

✓ 胸痛、呼吸困難、發燒、寒顫、咳嗽。

✓ 神智不清、出汗、飢餓、口渴或排尿增加。

✓ 深色尿或大便蒼白、失去食慾、皮膚或眼睛發黃。

✓ 心律不整。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

✓ 肌肉疼痛或無力。
✓ 皮膚顏色改變、嚴重曬傷、皮疹。
✓ 突然劇烈的胃痛、噁心、嘔吐、頭暈。

**如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：**

✓ 頭痛。
✓ 疲倦。
✓ 流鼻涕或鼻塞，喉嚨痛。
✓ 四肢疼痛。

**如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，**

**也請告知您的醫師。**