

商品名：癌必定膜衣錠

(Cabometyx[®])

學名：Cabozantinib

規格與劑量：40 毫克/粒



● 臨床用途：

● 腎細胞癌

單一療法適用於：

- (1) 未曾接受治療的中度/重度風險晚期腎細胞癌病人。
- (2) 先前經抗血管新生療法治療(anti-angiogenic therapy)的晚期腎細胞癌病人。

本品與 nivolumab 合併療法適用於未曾接受治療的晚期腎細胞癌病人。

● 肝細胞癌

適用於曾接受 sorafenib 治療之肝細胞癌病人。

● 分化型甲狀腺癌。

適用於治療成人及 12 歲以上孩童曾接受 VEGFR 標靶治療後惡化、放射碘治療無效或不適用放射碘治療的局部晚期或轉移性分化型甲狀腺癌病人。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
所有處方藥或非處方藥、維他命或中草藥；曾對任何藥物或食物過敏。

- 2 當有不尋常嚴重流血或出血之徵兆或症狀時，應聯絡醫療照護人員以尋求立即的醫療協助。
- 3 有可能出現胃腸不適，例如腹瀉、噁心、嘔吐及便秘，若這些不適持續存在或因服用 CABOMETYX 造成胃腸道穿孔及瘻管而導致嚴重腹痛時，應立刻尋求醫療協助。
- 4 有新出現的呼吸困難、胸痛或局部肢端水腫，應聯絡醫療照護人員。
- 5 應定期監測血壓，若血壓上升或出現高血壓的徵兆或症狀，應聯絡醫療照護人員。
- 6 當第一次出現糞便不成形或稀便的徵兆或排便頻率增加時，應通知醫療照護人員。
- 7 當皮疹惡化或無法耐受時，應聯絡醫療照護人員。
- 8 當發生黃疸、嚴重噁心或嘔吐或容易瘀青或出血時，應立即聯絡醫療照護人員。
- 9 正在接受 nivolumab 的病人，當發現腎上腺機能不全的徵象或症狀時，應立即聯絡醫療照護人員。
- 10 當出現蛋白尿的徵象或症狀時，應聯絡醫療照護人員。
- 11 應保持良好的口腔衛生習慣。請病人立即就醫檢查下顎骨壞死的相關病徵或症狀。
- 12 當預計進行任何外科手術(包括牙科手術)前，應聯絡醫療照護人員。
- 13 當出現新的神經功能問題或神經功能惡化時，應聯絡醫療照護人員。
- 14 當發現甲狀腺功能異常的徵象或症狀時，應立即聯絡醫療照護人員。
- 15 當出現低血鈣症的徵象或症狀時，應立即聯絡醫療照護人員。
- 16 治療期間若發現懷孕或疑似懷孕，應聯絡醫療照護人員。
- 17 有生育能力的女性於 CABOMETYX 治療期間及 CABOMETYX 最後一劑給藥後 4 個月內應採取有效的避孕措施。
- 18 婦女於 CABOMETYX 治療期間及 CABOMETYX 最後一劑給藥後 4 個月內不可哺乳。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- 19 告知病人應避免攝取葡萄柚、葡萄柚汁及聖約翰草(St. John' s Wort)
- 20 用餐前至少1小時內或用餐後至少2小時內不可服用 CABOMETYX。
- 21 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書, METEOR 試驗)

✓ ≥10%
腹瀉、噁心、嘔吐、口腔炎、便秘、腹痛、消化不良、疲倦、黏膜發炎、虛弱、食慾下降、肢端紅腫症、皮疹、皮膚乾燥、高血壓、體重減輕、味覺障礙、頭痛、暈眩、甲狀腺功能低下、發聲困難、呼吸困難、咳嗽、貧血、肢體疼痛、肌肉痙攣、關節痛、蛋白尿...等。
✓ <10%
傷口併發症、抽搐、胰臟炎、下顎骨壞死、膽汁鬱積性肝炎...等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，如皮膚紅疹、癢、臉或嘴唇或舌頭腫脹、胸悶、呼吸困難。
- ✓ 血尿或尿液混濁。
- ✓ 膚色變化、黑斑、感覺冷、體重減輕。
- ✓ 胸痛、呼吸困難、噁心、異常出汗、昏厥。
- ✓ 便秘、憂鬱、肌肉痙攣、體重增加、異常疲倦或虛弱。
- ✓ 深色尿或糞便顏色蒼白、噁心、嘔吐、食慾不振、胃痛、皮膚或眼睛發黃。
- ✓ 異常或大量出血或瘀傷。
- ✓ 吃飯或喝水時作嘔、咳嗽或窒息。
- ✓ 肌肉痙攣、口腔、指尖或腳周圍麻木和刺痛，手、手臂、腿或腳腫脹。

- ✓ 身體一側麻木或無力、突然或嚴重頭痛、癲癇發作、意識模糊、視力、言語或行走發生問題。
- ✓ 手掌或腳底出現皮疹、發紅、疼痛、腫脹或水泡。
- ✓ 血尿、血便、不明原因流鼻血、像咖啡渣的嘔吐物。
- ✓ 嚴重腹瀉。
- ✓ 下顎緊繃、口腔疼痛或麻木、牙齒鬆動。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 髮色改變。
- ✓ 食慾下降、味覺改變或喪失。
- ✓ 輕度腹瀉。
- ✓ 嘴唇、口腔或喉嚨出現潰瘍或白斑。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。