商品名：泰芮塔膜衣錠

(Tabrecta®)

學名：Capmatinib

規格與劑量：200 毫克/粒

● 臨床用途：

治療轉移性非小細胞肺癌(NSCLC) 的成人病人，其腫瘤帶有導致間質上皮轉化因子外顯子 14 跳讀式突變(MET exon 14 skipping mutation)。

● 注意事項：

1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。

2 發生可作為評估間質性肺病/ 肺炎徵兆的新或惡化的肺部症狀（ 例如：呼吸困難、咳嗽、發燒 ），請聯絡醫師。

3 應監測肝酵素(包括ALT和AST 及膽紅素)。

4 建議在服用泰芮塔治療期間應採取避免暴露於紫外線照射的預防措施，例如使用防曬乳或穿著防護衣物。建議病人在服用泰芮塔治療期間勿直接暴露於紫外線照射。

5 泰芮塔治療期間與接受最後一個藥物劑量後 1 週內應使用有效的避孕方式。

6 在接受泰芮塔治療期間以及接受最後一個藥物劑量後 1 週內不可哺乳。

7 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ **(≥10%)**
周邊水腫、噁心、疲勞、嘔吐、呼吸困難、發燒、咳嗽、非心因性胸痛、便秘、腹瀉及食慾減退…等。
✓ **(<10%)**
瘙癢(過敏性和全身性)、間質性肺病/ 肺炎、蜂窩性組織炎、急性腎損傷(包括腎衰竭)、蕁麻疹和急性胰臟炎…等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

✓ **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

✓ 胸痛、咳嗽、發燒、呼吸困難。

✓ 深色尿或大便蒼白、食慾不振、皮膚或眼睛發黃。

✓ 突然劇烈的胃痛、噁心、嘔吐、發燒、頭暈。

✓ 體重快速增加，手、腳踝或腳腫脹。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

✓ 便秘、腹瀉。

✓ 背痛。

✓ 疲倦。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您