

商品名：泛抑癌膜衣錠

(Truqap[®])

學名：Capivasertib

規格與劑量：200 毫克/粒



● 臨床用途：(節錄自藥品說明書)

- 與 fulvestrant 併用可治療患有荷爾蒙受體 (HR) 陽性、第二型人類表皮生長因子受體 (HER2) 陰性及具 PIK3CA/AKT1/PTEN 任一變異，且曾經接受內分泌治療，但疾病復發或惡化之局部晚期或轉移性乳癌成人病人。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有肝、腎、心臟功能和血糖疾病；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 此藥品未曾研究過用於有症狀的內臟疾病病人的療效及安全性。有臨床重大心臟病史的病人，包括 QTcF > 470 毫秒，有任何增加 QTc 延長、心律不整事件或心臟功能受損之風險因子，或有第一型糖尿病及需使用胰島素之第二型糖尿病病人，以及 HbA1C > 8.0% (63.9 mmol/mol) 的病人，皆被排除在 CAPItello-291 試驗之外。在開立 TRUQAP 給前述病人之前應考量上述情況。
- 3 在開始 TRUQAP 治療之前，必須檢測病人的空腹血糖 (FG) 和 HbA1C，以決定是否開始使用 TRUQAP 及降血糖藥物。TRUQAP

治療中依高血糖的嚴重程度而定，可暫時中斷 TRUQAP 給藥、調降劑量或永久停用。選擇降血糖用藥時，應考慮諮詢糖尿病專科醫師/內分泌專科醫師；需注意在暫停 TRUQAP 的幾天，使用糖尿病藥物可能發生低血糖。

- 4 依腹瀉的嚴重度而定，可中斷 TRUQAP 給藥、減少劑量或永久停用。一開始出現腹瀉表徵就開始止瀉治療，如果服用 TRUQAP 時發生腹瀉，應增加口服液體攝取量。腹瀉的病人必須維持循環血量正常及電解質平衡，以避免血容量過低、電解質過低的相關併發症。
- 5 應監測病人是否出現皮疹或皮膚炎的表徵和症狀，依皮膚藥物反應的嚴重度而定，可中斷 TRUQAP 給藥、減少劑量或永久停用。
- 6 在 capivasertib 治療期間，曾有倦怠的通報案例，如果出現這種症狀，應在駕駛或使用機械時應特別謹慎。
- 7 目前並無懷孕女性使用TRUQAP的資料。
- 8 無法排除對於哺乳幼兒的風險，TRUQAP 治療期間應停止哺乳。
- 9 在TRUQAP 治療期間及完成治療後的一定期間內，使用有效避孕措施：女性至少4週，男性至少16週。
- 10 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ ≥10%

腹瀉、皮疹、噁心、倦怠、嘔吐、口腔炎、高血糖、頭痛及食慾減退…等。

✓ < 10%

過敏、頭暈、急性腎損傷、口乾、藥疹、毒性皮膚疹、發熱、血中肌酸酐升高…等。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應：**搔癢或蕁麻疹、臉部或手部腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難。
- ✓ 起水皰、脫皮、紅疹。
- ✓ 發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、身體疼痛。
- ✓ 口渴、飢餓或排尿增加、體重減輕。
- ✓ 嚴重腹瀉、胃痛、口乾、血便或黑便。
- ✓ 異常疲倦或虛弱。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 噁心、嘔吐。
- ✓ 嘴唇、口腔或咽喉出現潰瘍或白色斑塊。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。