

商品名：安可坦膜衣錠（Xtandi®）

學名：Enzalutamide

規格與劑量：40 毫克/粒



臨床用途：

- 轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)，且與雄性素去除療法併用。
- 高風險非轉移性的去勢抗性前列腺癌。
- 轉移性的去勢抗性前列腺癌，且在雄性素去除療法失敗後屬無症狀或輕度症狀而不須使用化學治療者。
- 轉移性的去勢抗性前列腺癌，且已接受過 docetaxel 治療者。



注意事項：

1. 有下列情形請務必告訴醫師：痙攣病史、腦外傷、中風、原發腦腫瘤或腦轉移、酒精中毒。
2. 有服用其他藥品，如：成藥、保健品、維他命等，請告知您的醫師。
3. 膜衣錠不應切割、壓碎或咀嚼，應以水整粒吞服，可隨餐或空腹服用。
4. Xtandi 禁止孕婦或可能懷孕的婦女使用。

5. 在 Xtandi 治療期間和之後 3 個月，如果病人與孕婦從事性行為，必須使用保險套。在 Xtandi 治療期間和之後 3 個月，如果病人與有生育能力的婦女從事性行為，必須使用保險套和其他的避孕措施。
6. 懷孕或可能懷孕的女性不可以在沒有保護(例如手套)的情況下處理破損或損壞的 Xtandi 膜衣錠。
7. 請按時回門診追蹤/檢查。



副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- 過敏反應：搔癢或蕁麻疹、臉部或手部腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難。
- 起疱、脫皮、紅疹
- 胸痛或不適，肩膀、手臂、下巴或頸部疼痛
- 視力模糊、頭痛、心律不整、頭暈
- 頭痛、意識混亂、嗜睡、疲倦、虛弱或呆滯、視力模糊
- 癲癇、失去意識

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- 背部、關節或肌肉疼痛
- 便秘、腹瀉、噁心、嘔吐、食慾不振

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

—臉部、頸部、手臂或上胸發熱或發紅

—體重減輕

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。