

商品名：迫癌癒膠囊

(Braftovi[®])

學名：Encorafenib

規格與劑量：75 毫克/粒



● 臨床用途：

- 與 binimetinib 併用，治療帶有 BRAF V600 突變且無法切除或有轉移現象的黑色素瘤成人病人。
- 與 cetuximab 併用，治療帶有 BRAF V600E 突變且曾接受全身性療法的轉移性結腸直腸癌（CRC）成人病人。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有肝、腎功能不全病史；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 Braftovi 為口服使用。膠囊應配水整顆吞服，可搭配食物或不搭配食物服用。Encorafenib 應避免與葡萄柚汁同時服用。
- 3 如果漏服一劑encorafenib，只有在距離下次預定服藥時間超過12小時的情況下，方可補服漏服的劑量。
- 4 如果在施用encorafenib後嘔吐，病人不應重複服藥，而應在下一次預定服藥的時間再服藥。
- 5 建議在使用encorafenib和binimetinib之前、使用一個月後，接著在治療期間約每3個月一次或於臨床上必要時採用更高頻率，透過心

臟超音波或多門門心室功能攝影（MUGA）掃描評估左心室射出分率（LVEF）

- 6 使用encorafenib時可能發生出血，包括重大出血事件。
- 7 如果發現視覺障礙首次出現或惡化的症狀（包括中央視力減退、視力模糊或喪失視力），建議立即進行眼科檢查。
- 8 建議在啟用encorafenib之前、啟用一個月後，接著在治療期間約3個月一次或於臨床上有必要時採用更高頻率，應評估心電圖（ECG）。
- 9 在接受BRAF抑制劑的病人中曾觀察到新發生的原發性惡性腫瘤（皮膚與非皮膚相關），而且施用encorafenib時可能出現這些惡性腫瘤。
- 10 在使用encorafenib之前應監測肝功能數值，且在最初6個月治療期間至少每個月監測一次，之後則為臨床上必要時監測。
- 11 建議病人如果發生視覺障礙或任何其他可能影響其駕駛與操作機器能力的不良反應，應避免駕駛或操作機器。
- 12 懷孕期間以及未實施避孕且有生育能力的女性中，不建議使用encorafenib。如果在懷孕期間使用encorafenib或病人在使用encorafenib期間受孕，應告知病人胎兒可能面臨的危害。
- 13 不清楚encorafenib或其代謝物是否於人類乳汁中排出。必須考量到喝母乳對兒童的效益以及治療對母親的效益，做出停止哺餵母乳或停用encorafenib療法的決定。
- 14 具有生育能力的女性，必須在以encorafenib治療期間及最後一劑使用後至少1個月內，實施有效避孕。Encorafenib可能降低荷爾蒙避孕藥的效果。因此，建議正在使用荷爾蒙避孕藥的女性，應在encorafenib治療期間及使用最後一劑後至少1個月內使用額外或替代方法，例如：障礙避孕法（如：保險套）。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- 15 根據動物中的發現，使用encorafenib可能影響有生殖能力之雄性動物的生育力。由於此發現的臨床意義不明，因此應告知男性病人有精子生成能力受損的潛在風險。
- 16 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ ≥10%
黑色素細胞痣、皮膚乳突瘤、食慾減退、失眠、頭痛、味覺障礙、噁心、嘔吐、便秘、皮疹、搔癢、禿髮、關節痛、肌痛、疲累、發熱、 γ -麩胺醯轉移酶上升...等。
✓ <10%
新發生的原發性黑色素瘤、過敏、顏面輕癱、室上性心搏過速、胰臟炎、光敏感、皮膚脫皮、腎衰竭、轉胺酶上升...等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，如皮膚紅疹、癢、臉或嘴唇或舌頭腫脹、胸悶、呼吸困難。
- ✓ 牙齦出血、咳血、不正常流鼻血、尿液呈紅色或深棕色，血便或黑便。
- ✓ 深色尿或糞便顏色蒼白、噁心、嘔吐、食慾不振、胃痛、皮膚或眼睛發黃。
- ✓ 眼睛疼痛、視力變化、對光敏感。
- ✓ 心律不整。
- ✓ 發燒、疲倦。
- ✓ 手、手臂、腿或腳麻木、刺痛或燒灼痛。
- ✓ 異常出血、瘀血或虛弱。
- ✓ 無法癒合的紅色腫塊。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 痤瘡或粉刺。
- ✓ 便秘、腹瀉。
- ✓ 關節或肌肉疼痛。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。