

商品名：億珂膠囊

(Imbruvica®)

學名：Ibrutinib

規格與劑量：140 毫克/錠



臨床用途：

慢性淋巴球性白血病、小淋巴球性淋巴瘤、被套細胞淋巴瘤、Waldenström 氏巨球蛋白血症、邊緣區淋巴瘤或慢性移植體抗宿主疾病。



注意事項：

1. 有下列情形請務必告訴醫師：  
肝臟、糖尿病、高血壓、高血脂、心律不整、凝血問題；計畫懷孕或哺乳、已經懷孕或哺乳；有長期服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
2. 具有生育能力的女性在開始治療前進行懷孕檢測。
3. 不管男女，接受治療期間至接受最後一劑治療後至少 1 個月內應採取有效的避孕措施。
4. 可能會出現軟便或腹瀉的現象，如果腹瀉現象持續，請依照醫師指示處理，若不清楚請回門(急)診治療。建議補充足夠水分。
5. 治療期間容易感染，要遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。

6. 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
7. 避免葡萄柚及葡萄柚汁。
8. 藥品請整顆隨水吞服。切勿打開、破壞或咀嚼膠囊。
9. 請按時回門診追蹤檢查。



副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- 過敏反應，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- 感染相關症狀/徵象，如發燒、冷顫、喉嚨痛、耳或鼻疼痛、咳嗽、痰液增加或變色、排尿時感到疼痛、傷口久不癒合。
- 皮膚感染相關症狀，如傷口有滲出液、灼熱感、紅腫熱痛。
- 出血相關症狀/徵象，如解黑便、咳血、血尿、咖啡色嘔吐物、牙齦出血、陰道不正常出血、無來由的瘀青、不易止住的出血。
- 肝功能異常症狀，如尿液顏色變深、皮膚或眼白變黃、大便顏色變淺、食慾不振、嚴重胃部不適或嘔吐。
- 電解質失衡症狀，如情緒變化、意識錯亂。肌肉疼痛。心跳異常。嚴重頭暈、昏倒。易渴。癲癇發作。感覺非常疲倦或虛弱。沒有食慾。尿量減少或排尿困難。口乾，眼睛乾澀。嚴重胃部不適或嘔吐。
- 腎功能異常相關症狀，如：無尿、尿量改變、血尿。
- 高血壓症狀，如嚴重頭痛或頭暈、昏倒、視力改變。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- 喘。體重大幅增加。腿或手臂水腫。
- 身體一側無力或麻木，說話困難或無法理解，失去平衡或協調，臉部一側下垂或麻木、視力模糊。
- 痣的顏色或大小改變。皮膚出現腫塊。
- 心跳不正常，胸悶、覺得快暈倒、失去知覺。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- 頭痛、頭暈、虛弱、無力
- 肌肉痛、關節痛、肌肉痙攣
- 焦慮
- 感冒症狀
- 眼乾或眼淚增加
- 睡眠困難

**如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。**