

商品名：瑞伏駭膠囊

(Leavdo®)

學名：Lenalidomide

規格與劑量：10 毫克/粒；

25 毫克/粒



臨床用途：

多發性骨髓瘤。



注意事項：

1. 開始治療前，如有下列情形請先告知醫師：

懷孕；肝、腎疾病；曾發生藥物過敏；對乳糖過敏/乳糖不耐症；正在服用中的藥物，包括處方藥、成藥、保健食品、維他命；其他的健康問題。

2. 開始接受本藥的治療前，務必確認「本人沒有懷孕」。

3. 治療期間，避孕是絕對必要的，建議女性病人至少採取兩種值得信賴的避孕措施；男性病人則須使用保險套（即使曾接受結紮手術）；直到完成治療之後至少 1 個月。

4. 有需要接受牙科或其他外科處置時，應事先讓該科醫師知道您正接受本藥的治療。
5. 接種任何疫苗前，請先告知醫師。因為可能會增加感染的風險，或使疫苗失效。
6. 治療期間容易感染，要遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。
7. 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
8. 治療期間不要去捐血、捐精，直到完成治療之後至少 1 個月。
9. 服藥期間避免哺餵母乳。（安全性尚未確立）
10. 服藥前的叮嚀：本藥請配冷開水整粒吞服。膠囊禁止破壞/打開。若不慎接觸到藥品粉末，應立即以肥皂/水清洗乾淨。忘記服藥時，若距離該次服藥時間 12 小時以內，請立即補服，一旦超過 12 小時也只好作罷，提醒您，下次服藥還是服用醫囑指定的劑量，不要另外自行加量。藥品的保存，應避免熱/潮濕/光線等。



副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- 過敏反應，如皮膚紅疹、癢、臉或嘴唇或舌頭腫脹、胸悶、呼吸困難
- 小便的頻率改變
- 胸痛、呼吸困難、咳血
- 尿液顏色變深或糞便轉白、噁心、嘔吐、食慾不振、皮膚或眼睛變黃

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- 發燒、冷顫、咳嗽、喉嚨痛、全身酸痛
- 單側身體感覺麻麻的或無力；突發的或劇烈的頭痛；視力、
言語、行動有問題
- 不正常的出血、瘀青、或虛弱
- 淋巴腺腫、發燒（即使是微燒）

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- 腹瀉或便秘
- 眩暈
- 關節、背、肌肉疼痛
- 輕微紅疹、皮膚癢
- 倦怠

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。