**商品名：樂衛瑪膠囊**
**（Lenvima ®）**
**學名：Lenvatinib**
**規格與劑量：4 毫克/粒；**
**10 毫克/粒**

## 臨床用途：

分化型甲狀腺癌、腎細胞癌、無法手術切除且不適合局部治療之晚期肝細胞癌。

## 注意事項：

1. 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
   先天性 QT 間隔延長症、鬱血性心衰竭、緩脈性心律不整、使用已知會延長 QT 間隔的藥物；高血壓；心臟病；曾發生栓塞事件；肝、腎臟疾病；有長期服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
2. 育齡女性應先確認未懷孕才可開始本藥的治療。使用本藥品期間，不可懷孕或哺乳。
3. 服用本藥期間及使用最後一劑之後 1 個月內，使用適當的避孕措施。
4. 治療期間及使用最後一劑之後 1 周內避免哺餵母乳。
5. 可能較易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
6. 在某些患者有引起血栓形成的可能。如果發生以下情形，請立即回門（急）診治療：
   - ✓ 有任何胸痛(可能延伸至手臂、頸部、下巴、背部或胃部)。
   - ✓ 咳血、呼吸急促、腿部或手臂疼痛或腫脹。
   - ✓ 心悸、盜汗或蒼白，頭暈，無法解釋的疲倦、虛弱、焦慮。
   - ✓ 中風跡象，如：手腳或臉部突然發麻或無力，尤其是身體的單側，突然舉步困難。突然視力模糊、口齒不清、感到困惑。覺得昏眩，失去平衡或協調。突然不明原因頭痛欲裂。
7. 可整粒吞服，或將膠囊先溶解於小杯液體後服用。將膠囊放入一大湯匙的水或蘋果汁中(膠囊不需打開或壓碎)，以溶解於液體。將膠囊靜置於水或蘋果汁中至少 10 分鐘，再攪拌至少 3 分鐘。飲用混合液後，再加入一大湯匙的水或蘋果汁於玻璃杯中，攪勻後再飲用完水或蘋果汁。
8. 請按時回門診追蹤檢查。

## 副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

—**過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

—**電解質失衡症狀**，如情緒變化、意識錯亂。肌肉疼痛。心跳異常。嚴重頭暈、昏倒。易渴。癲癇發作。感覺非常疲倦或虛弱。沒有食慾。尿量減少或排尿困難。口乾，眼睛

乾澀。嚴重胃部不適或嘔吐。

—**腎功能異常相關症狀**，如：無尿、尿量改變、血尿、體重大幅增加。

—**血壓過高或過低的症狀**，如嚴重頭痛、頭昏眼花或昏厥、視力改變。

—**尿道感染相關症狀**，如血尿、解尿感疼痛或灼熱、頻尿、發燒、下腹疼痛、骨盆腔疼痛。

—手掌或腳掌發紅或刺激

—嚴重腹痛、腹瀉

—傷口無法癒合

—**肝功能異常症狀**，如尿液顏色變深、皮膚或眼白變黃、大便顏色變淺、食慾不振、嚴重胃部不適或嘔吐。

—**出血相關症狀**，如解黑便、咳血、血尿、咖啡色嘔吐物、牙齦出血、陰道不正常出血、無來由的瘀青、不易止住的出血。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

—味覺改變

—腹瀉、便秘、腹痛

—咳嗽

—食慾不振、腸胃不適

—頭暈、頭痛、疲倦、肌肉或關節痛

—口乾

—唇、口腔、喉嚨潰瘍或白點

—掉髮

—失眠

—聲音改變

—體重減輕

**如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。**

國泰綜合醫院藥劑科 關心您