

商品名：瘤利剋膜衣錠

(Lorviqua®)

學名：Lorlatinib

規格與劑量：25 毫克/粒



### ● 臨床用途：

適用於 ALK 陽性之晚期非小細胞肺癌(NSCLC)病人在使用(1)crizotinib 和後續至少一種其他的 ALK 抑制劑或(2)以 alectinib 或 ceritinib 做為第一種 ALK 抑制劑治療非小細胞肺癌發生惡化。

### ● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：  
糖尿病；高血脂；有長期服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品。尤其是 CYP3A4 誘導劑/抑制劑[如：某些抗生素、抗癲癇用藥、HIV 用藥]）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 基於發生嚴重肝臟毒性的可能性，Lorviqua® 禁止使用於正在接受強效 CYP3A 誘導劑的病人。
- 3 建議於開始治療前監測 ECG，隨後應定期監測。
- 4 可能出現血清膽固醇和三酸甘油酯升高的情況。
- 5 若您有糖尿病，建議治療期間也應密切監測血糖值。
- 6 育齡女性應先確認未懷孕才可開始本藥的治療。使用本藥品期間，不可懷孕或哺乳。服用本藥期間及最後一劑後至少 6 個月內，使用有效的非荷爾蒙避孕措施。

- 7 男性病人在治療期間及最後一劑後至少3個月內應使用有效的避孕措施。
- 8 治療期間及最後一劑後至少7天內避免哺餵母乳。
- 9 請於每天相同時間服用Lorviqua®。若遺漏劑量時應補服，除非下個劑量的服藥時間在4小時以內。請勿為了補足漏服的劑量而同時服用2個劑量。
- 10 若在服用後發生嘔吐，請勿服用額外劑量，但應繼續服用下個排定劑量。
- 11 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

### ● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ **≥10%**

情緒影響、周邊神經病變、認知影響、頭痛、頭暈、言語影響、睡眠影響、呼吸困難、咳嗽、視覺異常、腹瀉、噁心、便秘、嘔吐、關節痛、肌痛、背痛、四肢疼痛、水腫、疲倦、體重增加、發熱、上呼吸道感染、皮疹。高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症、高血糖症、AST 升高、低白蛋白血症、ALT 升高、脂肪酶升高、鹼性磷酸酶升高、澱粉酶升高、低磷血症、高血鉀症、滴血鎂症、貧血、血小板減少症、淋巴球減少症。

### 如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ **血糖上升相關症狀**，如意識模糊、昏昏欲睡的感覺、易渴、易餓、尿多、皮膚潮紅、呼吸急促、呼吸有水果味。
- ✓ **電解質失衡症狀**，如情緒變化、意識錯亂。肌肉疼痛。心跳異常。癲

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

癲發作。感覺非常疲倦或虛弱。沒有食慾。嚴重胃部不適或嘔吐。

- ✓ 神經系統相關症狀，如：焦慮、惡夢、睡眠異常、視覺異常、異常緊張、易怒、幻覺、情緒變化、自殺意圖、嚴重頭痛。
- ✓ 言語異常。注意力障礙、健忘、記憶損害。
- ✓ 肌肉無力、肌痛。
- ✓ 嚴重嗜睡、頭昏眼花或昏厥。
- ✓ 嚴重的疲倦、虛弱。
- ✓ 未預期的出血。
- ✓ 呼吸困難、咳嗽、發燒。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 體重增加。
- ✓ 疲倦、肌肉或關節痛、背痛、四肢疼痛。
- ✓ 腹瀉、便秘、腸胃不適。
- ✓ 感冒症狀。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。