商品名：Lysodren®

學名：Mitotane

規格與劑量：500 毫克/粒



● 臨床用途：

專案，無藥證。治療無法手術的功能型和非功能型腎上腺皮質癌瘤。

● 注意事項：

1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；
曾對任何藥物或食物過敏。

2 腎上腺抑制乃是mitotane的主要作用，因此當發生休克和嚴重外傷時，應立即暫時停用。因為在這種狀況下，受壓抑的腎上腺可能無法立即開始分泌類固醇，因此應該使用外源性類固醇(exogenous steroid)

3 治療期間避免哺乳。

4 治療期間避免懷孕。

5 可能會影響兒童和青少年的生長。

6 對小兒科患者的安全性和效力尚未建立。

7 可能引起高膽固醇或高三酸甘油酯。

8 可能發生鎮靜、嗜眠症、眩暈和其他中樞神經系統的副作用，患者在從事駕駛、操作機器和其他需要精神和身體方面警覺的危險性消遣時，要特別小心。

9 治療期間容易感染，要遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。

10 長期連續服用高劑量mitotane可能導致腦部損傷和功能受損。當連續使用mitotane治療超過兩年時，應定期執行行為和神經方面的評估。

11 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自 UpToDate 藥學資料庫 及 藥品說明書)

✓ **≥10%**
皮疹、厭食、噁心、嘔吐、腹瀉。以嗜睡和困倦表現的抑鬱、頭昏眼花或眩暈。
✓ **未知(無法從現有數據估計)**
眼睛(視線模糊、複視、晶體混濁、視網膜病變)；生殖泌尿系統(血尿、出血性膀胱炎和蛋白尿)；心臟血管系統(高血壓、直立性低血壓和臉發紅)；全身性疼痛、高熱和蛋白質結合碘(PBI)降低。
✓ **藥品上市後監測**
亞急性皮膚紅斑狼瘡。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

✓ **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

✓ **肝功能異常症狀**，如尿液顏色變深、皮膚或眼白變黃、大便顏色變淺、食慾不振、嚴重胃部不適或嘔吐。

✓ **腎上腺異常相關症狀**，如嚴重腸胃不適或嘔吐。嚴重頭痛頭暈、昏倒、肌肉無力、情緒變化、體重減輕。

✓ **甲狀腺功能異常相關症狀**，如便祕。記憶出現問題、情緒變化。感到手腳刺痛、疼痛、灼熱感

✓ 視力改變。

✓ 感到困惑、混亂。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- ✓ 情緒低落(憂鬱)。
- ✓ 失去平衡或協調。
- ✓ 乳房腫脹。
- ✓ 不正常陰道出血或骨盆疼痛。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 感到疲倦或虛弱。頭痛。
- ✓ 沒有食慾。腹瀉。腸胃不適。嘔吐。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。