商品名：癌剋挺膠囊

(Exkivity®)

學名：Mobocertinib

規格與劑量：40 毫克/粒



● 臨床用途：

治療先前已接受過含鉑化療之 EGFR 外顯子 20 插入突變之晚期非小細胞肺癌成年病人。

本適應症係依據腫瘤客觀反應率及反應持續時間加速核准，此適應症仍須執行確認性試驗以證明其臨床效益。

● 注意事項：

1 無論是持續服用中的藥物或想要服用其他藥物前（如：維他命、中草藥、成藥）或者是有停用藥物或更改劑量時，請務必先告知您的醫師或藥師。

2 Mobocertinib 可搭配或不搭配食物服用，請在每天大約同一時間服用。切勿打開、咀嚼或溶解膠囊的內容物。

3 接受mobocertinib治療的病人曾發生心跳速率校正後QT (QTc)間期延長，包括導致危及生命的心律不整(如Torsades de Pointes)。

4 針對新的或惡化的不明原因肺部症狀(例如呼吸困難、咳嗽和發燒)，請告知醫師。

5 若出現與心臟衰竭一致的徵象和症狀，請告知醫師。

6 若出現嚴重腹瀉，請告知醫師。

7 避免在接受mobocertinib治療期間懷孕。

8 請具生殖能力的女性在mobocertinib治療期間以及最後一劑後1個月內，使用有效的非荷爾蒙避孕法。

9 請告知女性伴侶具生殖能力的男性，在治療期間以及最後一劑mobocertinib後1週內使用有效的避孕措施。

10 接受mobocertinib治療期間和最後一劑後1週內應停止哺乳。

11 mobocertinib可能對生育力造成產生影響。

12 建議如果在服用mobocertinib時感到疲勞，不要駕駛或操作機械。

13 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書,不良反應所有級別)

✓ **非常常見(≥1/10)**
貧血、淋巴球減少、血小板計數減少、白血球計數減少、食慾減退、低鉀血症、低鈉血症、眼毒性、QT間期延長、腹瀉、噁心、口炎、嘔吐、丙胺酸轉胺酶增加、天門冬胺酸轉胺酶增加、皮疹、甲溝炎、皮膚乾燥、脫髮、血中肌酸酐上升、疲倦…等。
✓ **常見(≥1/100，<1/10)**
心臟衰竭、間質性肺病、急性腎損傷…等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

✓ **過敏反應**，如皮膚紅疹、癢、臉或嘴唇或舌頭腫脹、胸悶、呼吸困難。

✓ 胸痛、冷汗、呼吸困難。

✓ 心跳加速、劇烈或不規則、昏厥、頭暈。

✓ 發燒、寒顫、咳嗽、流鼻水或鼻塞、喉嚨痛、身體疼痛。

✓ 體重快速增加，手、腳踝或腳腫脹。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

✓ 嚴重腹瀉。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

✓ 食慾不振、噁心、嘔吐。
✓ 皮膚乾燥。
✓ 肌肉或骨骼疼痛。
✓ 指甲周圍發紅或疼痛，指甲鬆動。
✓ 嘴唇、口腔或喉嚨出現潰瘍或白斑。
✓ 疲倦。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您