商品名：令癌莎膜衣錠

（Lynparza ®）

學名：Olaparib

規格與劑量：150 毫克/錠

臨床用途：

Lynparza 單一療法可用於對先前含鉑藥物敏感且復發之高度惡性表皮卵巢、輸卵管腫瘤或原發性腹膜癌，在復發後對含鉑化療有反應(完全反應或部分反應)之成人病人，作為維持治療。

注意事項：

1. 有下列情形請務必告訴醫師：
   有長期服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
2. 具有生育能力的女性在開始治療前進行懷孕檢測。接受治療期間至接受最後一劑治療後至少 6 個月內應採取有效的避孕措施。
3. 治療期間及接受最後一劑治療後至少 1 個月內不可哺乳。
4. 治療期間及停藥後 3 個月內不得捐血，以免懷孕女性接受該血液後損及胎兒。
5. 治療期間容易感染，要遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。
6. 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
7. 避免葡萄柚及葡萄柚汁。
8. 藥品請整粒吞服，不可將錠劑咀嚼、壓碎或切半後吞服。
9. 請按時回門診追蹤檢查。

副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

—**過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

—**感染相關症狀/徵象**，如高燒、冷顫、喉嚨痛、耳或鼻疼痛、咳嗽、痰液增加或變色、排尿時感到疼痛、傷口久不癒合。

—**尿道感染相關症狀**，如血尿、解尿感疼痛或灼熱、頻尿、發燒、下腹疼痛、骨盆腔疼痛。

—**出血相關症狀/徵象**，如解黑便、咳血、血尿、咖啡色嘔吐物、牙齦出血、陰道不正常出血、無來由的瘀青、不易止住的出血。

—腿或手臂水腫。

—**肺功能異常相關症狀**，如：呼吸急促、呼吸困難、發燒。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

—噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃痛、沒有食慾

—虛弱、無力、頭暈、頭痛

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

—背痛、肌肉痛、關節痛

—感冒症狀

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。