商品名：愛乳適膠囊

(Ibrance®)

學名：Palbociclib

規格與劑量：100 毫克/粒

125 毫克/粒

● 臨床用途：

1 對於荷爾蒙受體為陽性、第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)呈陰性之局部晚期或轉移性乳癌之婦女或男性，IBRANCE 可與芳香環轉化酶抑制劑(aromatase inhibitor)合併使用。

2 對於荷爾蒙受體為陽性、第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)呈陰性之局部晚期或轉移性乳癌之病人，IBRANCE 可合併 fulvestrant 用於先前曾接受過內分泌治療者。。

● 注意事項：

1 無論是持續服用中的藥物或想要服用其他藥物前（如：維他命、中草藥、成藥）或者是有停用藥物或更改劑量時，請務必先告知您的醫師或藥師。

2 若您之前曾發生對藥物或食物過敏之情形，請先告知醫師。

3 有需要接受牙科或其他外科處置時，應事先讓該科醫師知道您正接受本藥的治療。

4 在尚未能完全掌握本藥對您個人可能造成的影響或副作用前，請避免開車或從事需要較高警覺性的工作。

5 治療期間容易感染，要遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。

6 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。

7 本品含有乳醣成分。有半乳糖不耐症、總乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良等罕見遺傳問題的病人不可使用本藥。

8 避免使用含有聖約翰草成分 (St. John’s Wort) （或稱金絲桃草）的製劑。

9 具生育能力且正在接受本藥治療的婦女或其男性伴侶在治療期間應採取適當的避孕措施(如雙重阻隔避孕法)，且女性與男性在治療結束後分別應繼續避孕至少3週或14週。

10 IBRANCE並不建議於懷孕期間使用，也不建議用於具生育能力但未採取避孕措施的婦女。

11 接受palbociclib治療的病人不可餵哺母乳。

12 每天於大約相同的時間服藥。如果病人嘔吐或漏服一劑藥物，當天不可額外再服一劑。應按照平常的時間服用下一個處方劑量。

13 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ **極常見(≥1/10)**
感染、嗜中性白血球減少症、白血球減少症、貧血、血小板減少症、食慾降低、噁心、口腔炎、腹瀉、嘔吐、皮膚乾燥、皮疹、禿髮、發燒、疲倦、無力、轉氨酶上升。
✓ **常見(≥1/100，<1/10)**
發燒性嗜中性白血球減少症、味覺障礙、視覺模糊、淚液分泌增加、眼睛乾燥、鼻出血、ILD/肺炎。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，如皮膚紅疹、癢、臉或嘴唇或舌頭腫脹、胸悶、呼吸困難。
- ✓ 眩暈、行走時感到吃力
- ✓ 出現懷疑與感染相關的症狀，如發燒、冷顫、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞或流鼻水、全身酸痛、傷口久不癒。
- ✓ 有針刺、灼熱、麻麻的等異常感覺。
- ✓ 容易瘀傷或出血、流鼻血。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 掉髮、髮量稀疏。
- ✓ 口內潰瘍。
- ✓ 腹瀉、便秘、胃不適。
- ✓ 倦怠或虛弱。
- ✓ 頭痛。
- ✓ 沒有食慾。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您