

商品名：達伯坦錠

(Pemazyre®)

學名：Pemigatinib

規格與劑量：13.5 毫克/粒



● 臨床用途：

適用於成人接受過全身性藥物治療、腫瘤具有 FGFR2 融合或重排、不可手術切除的局部晚期或轉移性膽管癌。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 達伯坦可造成包括 RPED 的眼睛毒性，如果出現任何視覺變化，立即通知其醫療人員。為了預防或治療乾眼症，應使用人工淚液或替代品、保濕或潤滑眼膠。
- 3 可能出現磷酸鹽濃度上升，因而需要監測血清磷酸鹽濃度。通知其醫療人員任何關於磷酸鹽濃度急性變化的症狀，例如肌肉痙攣、麻木或嘴周刺痛。
- 4 達伯坦可能引起指甲疾病。
- 5 女性病人，如果已懷孕或剛懷孕，應告知其醫療人員。告知女性病人有胎兒及流產風險。

- 6 具生殖能力的女性病人在接受達伯坦治療期間以及完成最後一劑後 1 週內，使用有效的避孕措施。
- 7 男性病人，若其女性伴侶具有生殖能力或已懷孕，在接受達伯坦治療期間以及完成最後一劑後 1 週內，使用有效的避孕措施。
- 8 病人在治療期間以及完成最後一劑後 1 週內勿哺乳。
- 9 請勿壓碎、咀嚼、切開或溶解藥錠。
- 10 如果錯過一劑達伯坦已超過 4 小時或更久的時間，或服用一劑後出現嘔吐，請直接於下一次給藥時間服藥。不可服用額外的藥錠來補充錯過的一劑。
- 11 在達伯坦治療期間避免葡萄柚產品。
- 12 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書-FIGHT-202)

✓ $\geq 1\%$

口腔炎、肢端紅腫症候群、關節痛、疲勞、腹痛、麩草醋酸轉胺酶 [AST] 上升、無力、發熱、麩丙酮酸轉胺酶 [ALT] 上升、膽管炎、小腸阻塞、鹼性磷酸酶濃度上升、腹瀉、黃疸、心電圖QT波延長、食慾下降、脫水、高血鈣症、高磷酸鹽血症、低磷酸鹽血症、背痛、四肢疼痛、昏厥、急性腎損傷、脫甲症和低血壓等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ 視力模糊或視力變化、眼睛乾。
- ✓ 骨頭痛、食慾不振、呼吸困難、不正常疲倦或虛弱。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- ✓ 手、臂、腳、腿或臉部肌肉痙攣。
- ✓ 嘴巴、指尖或腳周圍出現麻木和刺痛。
- ✓ 體重快速增加，手、腳踝或腳腫脹。
- ✓ 胃痛或痙攣、精神錯亂、癲癇發作、心律不規則、心情或精神改變。
- ✓ 不正常出血或瘀傷。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 背部、關節、手臂或腿部疼痛。
- ✓ 發現手指甲或腳趾甲副作用。
- ✓ 便秘、腹瀉、噁心、胃不適、嘔吐。
- ✓ 頭暈。
- ✓ 皮膚乾燥。
- ✓ 掉髮。
- ✓ 味覺喪失、味覺改變、口乾。
- ✓ 嘴唇、口腔或喉嚨出現潰瘍或白斑。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。