

商品名：德邁特膜衣錠

(Tepmetko[®])

學名：Tepotinib

規格與劑量：225 毫克/粒



● 臨床用途：

Tepotinib 適用於治療帶有導致間質上皮轉化因子外顯子-14 跳讀式突變 (MET exon 14 skipping mutation) 的轉移性之非小細胞肺癌 (NSCLC)。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 出現新的間質性肺病/非感染性肺炎相關症狀，或原有症狀惡化(例如呼吸困難、咳嗽、發燒)，請聯絡醫師。
- 3 應監測肝酵素(包括ALT和AST 及膽紅素)。
- 4 有生育能力的女性，或女性伴侶有生育能力的男性，在Tepotinib 治療期間直到最後一劑後1 週內，需使用有效的避孕方法。
- 5 在 Tepotinib 治療期間及最後一劑後 1 週內不可哺乳。
- 6 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ (≥10%)
水腫、倦怠、噁心、腹瀉、肌肉骨骼疼痛、呼吸困難、咳嗽、嘔吐、肺炎...等。
✓ (<10%)
間質性肺病、非感染性肺炎、皮疹、發燒、暈眩、搔癢與頭痛...等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ 過敏反應，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ 胸痛、咳嗽、發燒、呼吸困難。
- ✓ 深色尿或大便蒼白、噁心、嘔吐、食慾不振、胃痛、皮膚或眼睛發黃。
- ✓ 肌肉或骨頭痛。
- ✓ 體重快速增加，手、腳踝或腳腫脹。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 便秘、腹瀉。
- ✓ 疲倦。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。